

Поливалентная вакцина для последней повторной вакцинации щенков и повторной иммунизации взрослых собак



1 Вакцины для собак



Биокан Новел DHPPi/L4R

лиофилизат и растворитель для суспензии для инъекций для собак

СОСТАВ

Лиофилизированная фракция (живая ослабленная):

Вирус собачьей чумы, штамм CDV Bio 11/A - мин. $10^{5.1}$ ЦПД₅₀* макс. $10^{5.1}$ ЦПД₅₀*

Аденовирус собак тип 2, штамм SAV-2-Bio 13 - мин. $10^{3.6}$ ЦПД₅₀* - макс. $10^{5.1}$ ЦПД₅₀*

Парвовирус собак тип 2b, штамм CPV-2b-Bio 12/B - мин. $10^{6.2}$ ЦПД₅₀* - макс. $10^{6.6}$ ЦПД₅₀*

Вирус парагриппа собак, штамм CPiV-Bio 15 - мин. $10^{5.1}$ ЦПД₅₀* - макс. 10_{11} ЦПД₅₀*

*ЦПД – цитопатическая доза.

Жидкая фракция

(инактивированная):

Бактерии *Leptospira interrogans*, серогруппа Icterohaemorrhagiae, серовар Icterohaemorrhagiae, штамм MSLB 1089 ГЗТ** $\geq 1:51$ ВГЛД ***

Бактерии *Leptospira interrogans*, серогруппа Canicola, серовар Canicola, штамм MSLB 1090 ГЗТ** $\geq 1:51$ ВГЛД ***

Бактерии *Leptospira kirschneri*, серогруппа Grippotyphosa, серовар Grippotyphosa, штамм MSLB 1091 ГЗТ** $\geq 1:40$ ВГЛД ***

Бактерии *Leptospira interrogans*, серогруппа Australis, серовар Bratislava, штамм MSLB 1088 ГЗТ** $\geq 1:51$

** геометрическое значение титров
*** выше границы линейного диапазона

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Вакцина предназначена для активной иммунизации собак в возрасте 8-9 недель и старше:
- для предотвращения смертности и клинических симптомов,

вызванных вирусом собачьей чумы

- для предотвращения смертности клинических симптомов, вызванных аденовирусом собак, тип 1

- для предотвращения клинических симптомов, вызванных аденовирусом собак, тип 2, и снижения выделения вируса

- для предотвращения клинических симптомов, вызванных вирусом парагриппа собак, и снижения выделения вируса

- для предотвращения клинических симптомов, вызванных вирусом парагриппа собак, и снижения выделения вируса

- для предотвращения клинических симптомов, вызванных сероварами лептоспиры типа bratislava, canicola, grippotyphosa и icterohaemorrhagiae, инфицирования и экскреции с мочой

- для предотвращения смертности, клинических симптомов и инфицирования, вызванных вирусом бешенства

ДОЗИРОВКА

Для подкожного введения.

Схема первичной вакцинации:

2 дозы Биокан Новел DHPPi/L4R применяются отдельно через 3-4 недели, начиная с возраста 8-9 недель. Вторая доза должна вводиться в возрасте не менее 12 недель.
Бешенство
Первую дозу можно вводить в возрасте 8-9 недель

с использованием вакцины Биокан Новел DHPPi/L4.

В этом случае вторую вакцинацию с использованием Биокан Новел DHPPi/L4R не следует проводить ранее 12-недельного возраста. При необходимости можно прививать собак в возрасте до 8 недель, поскольку безопасность вакцины была продемонстрирована при ее введении собакам в возрасте 6 недель.

Схема повторной вакцинации:

Как минимум, три года после завершения схемы первичной вакцинации сохраняется иммунитет к вирусу собачьей чумы, аденовирусу 1, аденовирусу 2, парвовирусу собак и вирусу бешенства. Как минимум, в течение одного года после завершения схемы первичной вакцинации сохраняется иммунитет к вирусу парагриппа собак к бактериям рода лептоспира. Продолжительность иммунитета к бешенству была подтверждена после одной вакцинации в возрасте 12 недель.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца. Использовать немедленно после разведения согласно спецификациям.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить и транспортировать в холодильнике при температуре 2 °C – 8 °C. Не замораживать. Защищать от света.

УПАКОВКА

10 x 1 доза, 25 x 1 доза.