

Амоксициллин – антибактериальный препарат широкого спектра действия для инъекций с депо-эффектом



АМОКСИЦИЛЛИН 15% L.A.

Суспензия для инъекций

СОСТАВ

1 мл раствора для инъекций содержит *Amoxicillinum* (ut *Amoxicillinum trihydricum*) 150 мг

ЦЕЛЕВЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ
Крупный рогатый скот, свиньи, собаки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Лечение заболеваний, вызванных бактериями, чувствительными к амоксициллину, у крупного рогатого скота, свиней и собак. Особенно это относится к местным, желудочно-кишечным, респираторным и мочеполовым инфекциям. Антибактериальный спектр действия амоксициллина включает широкий спектр действия в отношении таких бактерий как *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. (не продуцирующие пенициллиназу), *Haemophilus* spp., *Corynebacterium* spp., *Brucella* spp., *Shigella* spp., *Clostridium* spp., *Fusobacterium necrophorum*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Listeria monocytogenes*, *Streptococcus faecalis*, *Salmonella* spp., *E. coli*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*. С другой стороны, пенициллиназа-продуцирующие штаммы, стафилококки, клебсиелла, псевдомонады и протей являются резистентными.

ДОЗИРОВКА

Обычная доза – 10 мг амоксициллина / 1 кг живого веса в день (1 мл / 15 кг живого веса в день).

Способ введения: внутримышечно

ПЕРИОД(Ы) КАРЕНЦИИ

Мясо:

Крупный рогатый скот: 15 дней.
Свиньи: 42 дня.

Молоко: 72 часа.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности 2 года, после первого открытия первичной упаковки: 28 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре ниже 25 °С. Защищать от света. Хранить в сухом месте.

УПАКОВКА

50 мл, 100 мл, 250 мл и 500 мл в стеклянном флаконе или пластиковых бутылках из ПЭНД.