

Для эффективной
заключительной
вакцинации щенков
в возрасте 12 недель



Биокан DHPPI + LR

лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций с разбавителем
Вакцина против собачьей чумы (CDV), инфекционного гепатита (CAV-1),
инфекционного ларинготрахеита (CAV-2), парвовируса (CPV-2),
парагриппа (CPiV-2) живая, а также против лептоспироза и бешенства
у собак инактивированная.

СОСТАВ

Компонент DHPPI - лиофилизат

Действующие вещества:

Вирус чумы собак (*Virus febris contagiosae canis*)

мин. $10^{3.0}$, макс. $10^{6.5}$ ЦПД₅₀*

Вирус инфекционного ларинготрахеита собак (*Virus laryngotracheitidis contagiosae canis*)

мин. $10^{3.5}$, макс. $10^{6.5}$ ЦПД₅₀*

Вирус парвовирусного энтерита собак (*Virus parvovirus enteritidis canis*)

мин. $10^{4.5}$, макс. $10^{6.5}$ ЦПД₅₀*

Вирус парагриппа собак (*Virus parainfluenzae canis*)

мин. $10^{3.0}$, макс. $10^{6.2}$ ЦПД₅₀*

*ЦПД – цитопатическая доза.

Компонент LR – разбавитель:

Действующие вещества:

Вирус бешенства (*Virus rabiei*) инактивированный мин. 2 МЕ

Бактерии *Leptospira icterohaemorrhagiae* инактивированные мин. 32 титра, определяемые РМА*)

Бактерии *Leptospira canicola* инактивированные мин. 32 титра, определяемые РМА*)

Бактерии *Leptospira grippotyphosa* инактивированные

мин. 32 титра, определяемые РМА*)

*) среднее геометрическое титров специфических антител, определяемое реакцией микроагглютинации (РМА)

ЦЕЛЕВЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ

Собаки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Вакцина предназначена для активной иммунизации собак в возрасте 12 недель и старше против собачьей чумы, инфекционного гепатита, инфекционного ларинготрахеита, парвовируса, парагриппа, бешенства и наиболее часто встречающихся сероваров лептоспир (*Leptospira icterohaemorrhagiae*, *Leptospira canicola*, *Leptospira grippotyphosa*).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С ДРУГИМИ

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ

СРЕДСТВАМИ И ДРУГИЕ

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Вакцина Биокан DHPPI + LR может использоваться отдельно или одновременно с другими вакцинами Биокан С, Биокан М Плюс, Биокан В.

ДОЗИРОВКА

1 мл независимо от веса и породы животного в возрасте 12 недель и старше. Повторную вакцинацию проводят в течение 14–21 дня. Для поддержания устойчивого иммунитета у привитых животных повторную вакцинацию повторяют один раз в год.
Путь введения вакцины – подкожно. Иммунитет вырабатывается через 14 дней после первой вакцинации, а устойчивый иммунитет еще через 14 дней после повторной вакцинации.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом темном месте при температуре 2 °С – 8 °С. Не замораживать!

УПАКОВКА

5 × 1 мл вакцины Биокан LR + 51 мл лиофилизированной вакцины Биокан DHPPI
10 × 1 мл вакцины Биокан LR + 10 × 1 мл лиофилизированной вакцины Биокан DHPPI
50 × 1 мл вакцины Биокан LR + 50 × 1 мл лиофилизированной вакцины Биокан DHPPI.