

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Адвантейдж®

2. Склад

100 мл препарату містять:

діючу речовину імідаклоприд – 10,0 г.

Допоміжні речовини: безголовий спирт, пропілену карбонат, антиоксидант бутилідроксигідрогенол.

3. Фармацевтична форма

Краплі спот-он.

4. Фармакологічні властивості

ATC vet: QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX17, імідаклоприд)

Діюча речовина препарату *Імідаклоприд*, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-*ylidene*amine – ектопаразитицид, що належить до групи хлорікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приспішується до нікотинергічного рецептора блохи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що в попадальному призводить до загибелі паразита.

Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців зумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин. Імідаклоприд ефективний проти личинок бліх та зрілих особин.

Після місцевого застосування препарату імідаклоприд швидко розповсюджуються по всій тілі тварин впродовж однієї доби після нанесення. Клінічно доведено, що система абсорбція препарату дуже низька.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Коти, декоративні кролі.

5.2 Показання до застосування

Профілактика та лікування котів і декоративних кролів при ураженні блохами *Stenoccephalides felis*. Препарат може бути застосований для лікування алергічного блошиного дерматиту. Одна обробка захищає тварину від повторної інвазії протягом 4-х тижнів.

5.3 Протипоказання

Не застосовувати конінам віком до 8-ми тижнів!

Не застосовувати декоративним кролям віком до 10-ти тижнів!

Не застосовувати кролім, м'ясо яких призначається для вживання в їжу людям!

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчувствливістю до складових препарату!

5.4 Побічна дія

Препарат гаркій на смак і може викликати саліванію у тварин при засмажуванні препарату після нанесення на шкіру, але це не є ознакою інтоксикації. Ознаки гіперреалізації зникають через декілька хвилин.

У дуже рідких випадках після нанесення препарату можуть виникнути такі шкірні реакції як затрия шерсті, почервоніння, свербіж та ураження шкіри. Може виникнути слизиста та інші розлади нервової системи, такі як порушення координації, тремор і депресії, які були зареєстровані ніколи у котів.

5.5 Особливі застереження при використанні

Обробку тварин препаратом треба проводити таким чином, щоб препарат не попадав тварині в очі та ротову порожнину.

Після обробки тварин препаратом не допускати контакту тварин, одни з одним до повного висихання шкіри.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Застережень немає.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

При дворазовому підвищенні рекомендованої дози препарату та одночасному застосуванні таких ветеринарних препаратів, як луфенорон, пірантел, празиквантел несумісності не спостерігалось. Також доведена сумісність препарату при одночасному використанні багатьох ветеринарних препаратів, у тому числі і вакцин.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку


Для тварин масою тіла до 4 кг застосовують 1 піпетку Адвантейдж® 40 (0,4 мл), більше 4 кг - Адвантейдж® 80 (0,8 мл).

Повторна інвазія блохами із зовнішнього середовища можлива через 6 тижнів і більше після обробки. Додатково рекомендується обробляти місця перебування тварин (підстилки, коврики) для знищення дорослих та личинкових стадій бліх.

Препарат не втрачає ефективності при намоканні шерсті тварини, але у таких випадках можливі додаткова обробка – залежно від наявності бліх у напакованому середовищі. У таких випадках не рекомендується обробляти тварину частіше, ніж 1 раз на тиждень.

Способ застосування:

Вийміть піпетку з упаковки, тримайте у вертикальному положенні. Зніміть ковпачок, перекверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видавивши фольгу.



Розділіть шерсть на шар тварини біля основи черепа так, щоб було видно шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, щоб нанести весь іміст безпосередньо на шкіру.



Використовувати тільки на непошкодженні шкіри. Не допускати здвоєної оброблення тварин застосувати одне одного!

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

При 5-кратному перевищенні рекомендованої дози препарату для котів та 4-кратному перевищенні для кролів впродовж 4-х тижнів поспіль у тварин не спостерігалося клінічних ознак передозування.

5.10 Спеціальні застереження

Немає.


5.11 Период винесення (карениці)

Для непродуктивних тварин не регламентується.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, пити і приймати їжу.

Розділіть шерсть на шкірі тварини біля основи черепа так, щоб було видно шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, щоб настити весь сміс безпосередньо на шкіру.



Використовувати тільки на непошкодженні шкіру. Не допускати щойно оброблених тварин вилігувати одне одного!

Протипоказання

Не застосовувати конісним ікком до 8-ми тижнів.

Не застосовувати декоративним кроликом ікком до 10-ти тижнів.

Не застосовувати кролям, м'ясо яких призначається для вживання в їжу людям.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчувствливістю до складових препарату.

Застереження

Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, пити і приєммати їжу.

Обробку тварин рекомендується проводити у захищених рукавицях.

Після закінчення роботи необхідно вимити руки теплою водою з мильом. При іннадцятковому падінні препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно відразу промити проточною водою. Якщо після попадання препарату на шкіру або в очі подразнення після промивання водою неникає, необхідно звернутися за медичною допомогою.

Не можна гладити тварину і допускати її до маленьких дітей протягом 48 годин після обробки препаратом.

Форма випуску

Пропіленові піпетки 0,4 мл (Адвантейдж ® 40) та 0,8 мл (Адвантейдж ® 80).

Зберігання

Препарат зберігають у сухому темному, добре вентильованому, приміщенні на стелажах при температурі від 5 до 25 °C.

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів.

Термін придатності

5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Байєр Енімал Хелс ГмбХ (Німеччина)
D-51368, Леверкузен

Виробник готового продукту

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
(Німеччина)
Проєнслорфер стр. 324, D-24106 Кіль

Bayer Animal Health GmbH (Germany)
D-51368, Leverkusen

KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH
(Germany)
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel

Розділіть шерсть на шкірі тварини біля основи черепа так, щоб було видно шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, щоб нанести весь сміс безпосередньо на шкіру.



Використовувати тільки на непошкодженні шкіри. Не допускати щойно оброблених тварин вилігувати одне одного!

Протипоказання:

Не застосовувати коніситамін віком до 8-ми тижнів.

Не застосовувати декоративним кроликом віком до 10-ти тижнів.

Не застосовувати кролям, м'ясо яких призначається для вживання в їжу людям.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчувствливістю до складових препарату.

Застереження:

Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, піти і приємати їжу.

Обробку тварин рекомендується проводити у захищених рукавицях.

Після закінчення роботи необхідно вимити руки теплою водою з мильом. При інцидному попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно відразу промити проточною водою. Якщо після попадання препарату на шкіру або в очі подразнення після промивання водою не зникає, необхідно звернутися за медичною допомогою.

Не можна гладити тварину і допускати її до маленьких дітей протягом 48 годин після обробки препаратом.

Форма випуску:

Пропіленові піпетки 0,4 мл (Адвантейдж ® 40) та 0,8 мл (Адвантейдж ® 80).

Зберігання:

Препарат зберігають у сухому темному, добре вентильованому, приміщенні на стелажах при температурі від 5 до 25 °C.

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів.

Термін придатності:

5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:


Байер Енімал Хелс ГмбХ (Німеччина)
D-51368, Леверкузен

Виробник готового продукту:

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
(Німеччина)
Проєксдорфер стр. 324, D-24106 Кіль

Bayer Animal Health GmbH (Germany)
D-51368, Leverkusen

KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH
(Germany)
Projektsdorfe Str. 324, D-24106 Kiel



Z 14.7.2012

zu speziell für Ihre Rasse! Mischtechnik AA-05099-03-1-4
Für Katzen 3

