

АЙСИДИВИТ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ



(/upload/iblock/587/aisidivit_100ml.jpg)

Форма выпуска:

Стеклянные флаконы по 100 мл.

Преимущества

- Уникальный состав обеспечивает высокую эффективность.
- Надежная безопасность готовой лекарственной формы.
- Универсальная терапевтическая и профилактическая активность.
- Простота и удобство в применении.

Состав и фармакологические свойства

«Айсидивит» – выпускают в форме эмульсии для инъекций, содержащей в 1 мл: АСД 2-Ф субстанцию – 0,04 г, витамин А – 15000 ЕД, витамин Е – 10 мг, янтарную кислоту – 0,05 г.

Препарат является комплексным иммуностимулирующим препаратом.

Показания к применению.

"Айсидивит" назначают крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям и собакам с лечебной и профилактической целью для повышения естественной резистентности, стимуляции роста и развития молодняка, при патологических состояниях, сопровождающихся снижением иммунореактивности организма, в том числе при нарушениях обмена веществ, болезнях желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой системы, дерматитах, экземах, длительно незаживающих ранах, у ослабленных и переболевших инфекционными и инвазионными болезнями, а также для повышения продуктивности животных."

Противопоказания.

Запрещается применение "Айсидивита" при повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

Дозы и порядок применения.

Препарат вводят внутримышечно 3 -5 раз с интервалом 3 дня в следующих дозах на 1 животное:

крупному рогатому скоту массой 400-500 кг	10–15 мл	
телятам	5–6 мл	
овцам, свиньям	2–4 мл	
ягнятам, козлятам	1–1,5 мл	
пороссятам-сосунам	1 мл	
пороссятам-отъемышам	1–2 мл	
собакам массой	до 10 кг	0,2 мл
	от 10 до 30 кг	0,5 мл
	свыше 30 кг	1 мл

- Для стимуляции и нормализации половой функции у бесплодных коров с гипофункцией яичников препарат вводят за 30, 25 и 20 дней до осеменения в дозе 10–15 мл на животное.
- Для повышения оплодотворяемости, профилактики эмбриональной смертности, сокращения сервис-периода препарат вводят в день осеменения, на 5 и 10 сутки после осеменения в дозе 10–15 мл на животное.
- Для профилактики послеродовых осложнений, эндометритов, задержки последа и гипоксии плода препарат вводят коровам в сухостойный период 4 раза с интервалом 10 дней в дозе 10–15 мл на животное.
- Для восстановления овуляции у коров препарат вводят на 5, 10, 15 сутки после отела в дозе 8–10 мл на животное.
- Для повышения жизнеспособности эмбрионов у супоросных свиноматок препарат применяют на 7 и 12 сутки после осеменения в дозе 3 мл на животное.
- Для профилактики гипоксии плода препарат применяют свиноматкам на 45, 70, 85 дни супоросности в дозе 5 мл на животное.

Побочные явления.

Побочных явлений, как правило, не наблюдается. При появлении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты.

Хранение.

Хранить препарат в защищенном от света месте при температуре от 00 до +25°С. Срок хранения – 2 года со дня производства; после прокола пробки – не более 30 суток.