

Азидин-вет

порошок для инъекционного раствора



Состав

1 г препарата содержит:

диминазена ацетурат — 438 мг
феназон — 562 мг

Описание

Порошок желтого цвета, однородный, без запаха.

Фармакологические свойства

Антибактериальный препарат широкого спектра действия.

Диминазена ацетурат — ионный ассоциат 4,4-(диазоамино)-добензамидина с N-ацетилглицином — активен против возбудителей протозоозы родов *Babesia*, *Tyranosoma*, *Theileria*, обладает антибактериальными и фунгиостатическими свойствами. Механизм действия диминазена ацетурата заключается в изменении процессов аэробного гликолиза и синтеза ДНК простейших, что приводит к их гибели.

Феназон имеет анальгезирующие и антипиринные свойства, снижает проницаемость сосудов.

После применения препарат защищает организм животных от реинвазии и восстановления активности возбудителей пироплазмидозов на протяжении 10–15 суток.

Показания

Лечение и профилактика **крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, собак, котов** при кровопаразитарных заболеваниях — бабезиозе, трипаносомозе, тейлериозе.

Противопоказания

Не назначать животным с воспалительными процессами в почках.



Способ применения и дозы

Перед применением препарата готовят его раствор 7%. Для этого во флакон с порошком 0,24, 2,4 или 24 г добавляют воду для инъекций 1,25, 12,5 или 125 мл, соответственно.

Водный раствор препарата вводят внутримышечно или подкожно в следующих дозах:

- **крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади** — 1 мл раствора 7% на 20 кг массы тела (это соответствует 3,5 мг диминазена ацетурата на 1 кг массы тела);
- **собаки, коты** — 0,1 мл раствора 3,5% (содержимое флакона растворяют в двойном объеме воды для инъекций) на 2 кг массы тела.

Если после введения рассчитанной дозы общее состояние животного не улучшилось, препарат вводят повторно через 24–30 часов в той же дозе.

Если терапевтическое действие препарата слабое, его дозу можно увеличить в 1,5–2 раза, но так, чтобы общая суммарная доза для одного взрослого животного не превышала 60 мл раствора препарата 7%.

При обнаружении первых случаев заболевания препарат вводят всем животным стада (группы, отары) в целях профилактики. Профилактическая доза составляет 1 мл на 40 кг массы тела.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 20 суток, людям употреблять в пищу молоко можно через 3 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока, используют для кормления плотоядных животных или изготовления мясокостной муки, молоко выпаивают животным после термической обработки.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 0,24, 2,4, 24 г.

Условия хранения

В темном месте при температуре от +8 до +20 °С.

Готовый раствор хранить в холодильнике и использовать в течение 14 суток.

Срок годности

2 года.