

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Больфо® спрей

2. Склад

100 мл препарату містять діючу речовину:

пропоксур – 0,25 г.

Допоміжні речовини: 2-пропанол, безводна лимонна кислота, пропан, бутан.

3. Фармацевтична форма

Спрей для зовнішнього застосування, розчин.

4. Фармакологічні властивості

ATCvet QR53, ектопаразитоциди, інсектициди і репеленти (QR53AE02, пропоксур)

Діюча речовина препарату, пропоксур, діє на ектопаразитів як контактна отрута, викликаючи токсичну акумуляцію нейрогормону ацетилхоліну на холінергічних нервових закінченнях, внаслідок чого настає загибель ектопаразитів (блохи, кліщі, воші тощо). Для ссавців пропоксур не токсичний.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Собаки, коти.

5.2 Показання до застосування

Профілактика та лікування собак і котів при ектопаразитарних захворюваннях, викликаних блохами (*Stenoccephalides*) і кліщами (*Ixodidae*).

5.3 Протипоказання

Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам, а також тваринам чутливим до складників препарату!

Не застосовувати кошенятам на цуценятам до 3-х місячного віку!

Не застосовувати тваринам із ушкодженням шкіри!

Не застосовувати продуктивним тваринам!

5.4 Побічна дія

Невідома.

5.5 Особливі застереження при використанні

Немає.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не застосовувати самкам під час лактації та в останні місяці вагітності!

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з іншими інсектицидами та акарицидами!

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Препарат Больфо® спрей застосовують зовнішньо.

Перед застосуванням флакон струшують і, натискаючи на розпилювач, впродовж декількох секунд, скеровують струмінь препарату з відстані 30-40 см на тулуб тварини проти росту шерсті до її легкого зволоження. Прикриваючи очі тварини, обробляють вухні раковини і груди, далі кінчиками пальців втирають препарат на шерсть навколо очей і носа, після чого обприскують шию, тулуб, кінцівки і хвіст. При обробці тварин препаратом уникають попадання препарату а очі та ніс.

Препарат Больфо® спрей знищує бліх та кліщів миттєво після нанесення. Загиблих після обробки кліщів, які залишилися прикріпленими до шкіри тварин, видаляють механічно. Тварин, які утримуються разом, рекомендують обробляти одночасно проти бліх.

Молодих тварин обробляють препаратом з 3 місячного віку.

Місця перебування тварин, підстилки, килимки та інші засоби догляду за тваринами рекомендують періодично обробляти відповідними інсектицидами.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

У рекомендованих дозах Больфо® спрей не викликає шкірно-подразнюючої і резорбтивно-токсичної дії, подразнення слизових оболонок.

При передозуванні дози препарату вдвічі, симптомів передозування у тварин не спостерігали.

При підвищеній індивідуальній чутливості тварини до препарату (сльозотеча, салівація, тремор м'язів, блювота) або при появі ознак подразнення шкіри, препарат змивають водою з милом, а при необхідності звертаються до лікаря ветеринарної медицини.

При випадковому попаданні препарату у травний канал тварини спостерігали такі симптоми як салівація, тремор м'язів, блювота та діарея. У таких випадках необхідно негайно звернутися до лікаря ветеринарної медицини.

Антидот: атропіну сульфат.

5.10 Спеціальні застереження

Часте застосування інсекто-акарицидів призводить до розвитку резистентності в ектопаразитів.

Після нанесення препарату тваринам не дозволяти плавати у відкритих водоймах впродовж 3-х діб!

5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин не визначають.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Препарат застосовують зовнішньо. Не розпилювати препарат біля відкритого вогню та гарячих відкритих поверхонь! Не користуватися пошкодженим балоном! Не вдихати препарат!

Обробку тварин проводять на повітрі або у добре вентильованих приміщеннях, у гумових рукавицях. Використання спрею може призвести до вибуху суміші газів, тому не можна використовувати його надмірно, особливо, у маленьких закритих приміщеннях.

Під час обробки тварин препаратом не можна вживати їжу, пити, курити.

Уникати попадання препарату на відкриті ділянки шкіри, в очі. Препарат викликає подразнення (почервоніння) очей, при контакті зі шкірою можливі алергічні реакції. При випадковому попаданні препарату в очі або на шкіру його негайно змивають великою кількістю проточної води.

При випадковому попаданні препарату всередину (ШКТ) виникають слинотеча, блювота, діарея. У таких випадках необхідно терміново звернутися до лікаря і показати листівку-вкладку або етикетку препарату.

Після роботи з препаратом руки ретельно миють, а приміщення, у якому обробляли тварин, добре провітрюють.

Люди з гіперчутливістю до пропоксуру та вагітні жінки (третій триместр) повинні уникати контакту з препаратом.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Не встановлені.

6.2 Термін придатності

3 роки.

6.3 Особливі заходи зберігання

Препарат зберігають в герметичному упакованні виробника у сухому, недоступному для дітей та тварин, місці окремо від кормів та продуктів при температурі від 0 до 30 °С. Уникати прямих сонячних променів при зберіганні.

Не заморозувати!

Не зберігати в холодильнику!

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Бляшаний або алюмінієвий флакон об'ємом 250 мл. Клапан спрею міститься у трубці.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний або протермінований препарат та упаковання утилізують відповідно до чинного законодавства.

Пропоксур (ДР) небезпечний для риб та інших водних організмів.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ (Німеччина)
D-51368, Леверкузен

Bayer Animal Health GmbH (Germany)
D-51368, Leverkusen

8. Назва і місце знаходження виробника

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
(Німеччина)
Пройенсдорфер штрассе 324
D-24109, Кіль

KVP Pharma und Veterinar Produkte
GmbH (Germany)
Projensdorfe Strabe 324
D-24109 Kiel

9. Додаткова інформація

Больфо® спреј
(спреј для зовнішнього застосування, розчин)
листівка-вкладка

Опис

Розчин зі слабким специфічним запахом.

Склад

100 мл препарату містять діючу речовину:

пропоксур – 0,25 г.

Допоміжні речовини: 2-пропанол, безводна лимонна кислота, пропан, бутан.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP53, ектопаразитоциди, інсектициди і репеленти (QP53AE02, пропоксур)

Діюча речовина препарату, пропоксур, діє на ектопаразитів як контактна отрута, викликаючи токсичну акумуляцію нейрогормону ацетилхоліну на холінергічних нервових закінченнях, внаслідок чого настає загибель ектопаразитів (блохи, кліщі, воші тощо). Для ссавців пропоксур не токсичний.

Застосування

Профілактика та лікування собак і котів при ектопаразитарних захворюваннях, викликаних блохами (*Stenoccephalides*) і кліщами (*Ixodidae*).

Дозування

Препарат Больфо® спреј застосовують зовнішньо.

Перед застосуванням флакон струшують і, натискаючи на розпилювач, впродовж декількох секунд, скеровують струмінь препарату з відстані 30-40 см на тулуб тварини проти росту шерсті до її легкого зволоження. Прикриваючи очі тварини, обробляють вухні раковини і грудину, далі кінчиками пальців втирають препарат на шерсть навколо очей і носа, після чого обприскують шию, тулуб, кінцівки і хвіст. При обробці тварин препаратом уникають попадання препарату а очі та ніс.

Препарат Больфо® спреј знищує бліх та кліщів миттєво після нанесення. Загиблих після обробки кліщів, які залишилися прикріпленими до шкіри тварин, видаляють механічно. Тварин, які утримуються разом, рекомендують обробляти одночасно проти бліх.

Молодих тварин обробляють препаратом з 3 місячного віку.

Місця перебування тварин, підстилки, килимки та інші засоби догляду за тваринами рекомендують періодично обробляти відповідними інсектицидами.

Протипоказання

Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам, а також тваринам чутливим до складників препарату!

Не застосовувати кошенятам на цуценятам до 3-х місячного віку!

Не застосовувати тваринам із ушкодженням шкіри!

Не застосовувати продуктивним тваринам!

Застереження

Не застосовувати самкам під час лактації та в останні місяці вагітності!

Препарат застосовують зовнішньо. Не розпилювати препарат біля відкритого вогню та гарячих відкритих поверхонь! Не користуватися пошкодженим балоном! Не вдихати препарат!

Обробку тварин проводять на повітрі або у добре вентильованих приміщеннях. Використання спрею може призвести до вибуху суміші газів, тому не можна використовувати його надмірно, особливо, у маленьких закритих приміщеннях. Після обробки препаратом тваринам не дозволяють купатися у відкритих водоймах впродовж 3-х діб.

Після роботи з препаратом руки ретельно миють, а приміщення, у якому обробляли тварин, добре провітрюють.

Люди з гіперчутливістю до пропоксуру повинні уникати контакту з препаратом.

Форма випуску

Бляшаний або алюмінієвий флакон об'ємом 250 мл. Клапан спрею міститься у трубці.

Зберігання

Препарат зберігають в герметичному упакованні виробника у сухому, недоступному для дітей та тварин, місці окремо від кормів та продуктів при температурі від 0 до 30 °С. Уникати прямих сонячних променів при зберіганні.

Не заморозувати!

Не зберігати в холодильнику!

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ (Німеччина)
D-51368, Леверкузен

Bayer Animal Health GmbH (Germany)
D-51368, Leverkusen

Виробник готового продукту

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
(Німеччина)
Пройєнсдорфер штрассе 324 Д-24109, Кіль

KVP Pharma und Veterinar Produkte GmbH
(Germany)
Projensdorfe Strabe 324 D-24109 Kiel



Bolfo[®]



Больфо спрей

Проти бліх та кліщів
Против блох и клещей

Для обробки собак і котів
Для обработки собак и кошек



UA

Склад: 100 мл препарату містять 0,25 г пропоксуру.
Показання до застосування: Профілактика та лікування собак і котів при ектопаразитарних захворюваннях, викликаних блохами (Scleroserhales), вошами (Linognathus), волоссядами (Trichodectes) і кліщами (Ixodidae).
Досування та спосіб застосування: Див. листівку-вкладку.

Препарат Больфо спрей застосовують зовнішньо. Перед застосуванням флакон струшують і, натискаючи на розпилювач, впродовж декількох секунд, спрямовують струмінь препарату з відстані 30-40 см на тупу частину тварини проти росту шерсті до її легкого зволоження. Препарат Больфо спрей знищує бліх та кліщів миттєво після нанесення. Місця перебування тварин, підстилки, клітки та інші засоби догляду за тваринами рекомендують періодично обробляти відповідними інсектицидами.

Противопоказання: Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам, тваринам чутливим до складників препарату. Не застосовувати тваринам до 3-х місячного віку. Не застосовувати тваринам із ушкодженою шкірою. Не застосовувати продуктивним тваринам.

Умови зберігання: Препарат зберігають в герметичному упакованні виробника у сухому, недоступному для дітей та тварин, місці окремо від кормів та продуктів при температурі від 0 до 30 °С. Уникати прямих сонячних променів при зберіганні. Не заморозувати. Не зберігати в холодильнику.

Термін придатності: 3 роки.
Власник реєстраційного посвідчення: Байер Енімал Хелс ГмБХ, D-51368, Лєверкюзен, Німеччина
Виробник: КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмБХ, Киль, Німеччина
РП в Україні: № AA-01004-01-10

Використати до: див. дату на дні упаковки.

RU

Состав: 100 мл препарата содержат 0,25 г пропоксура.
Показания к применению: Профилактика и лечение собак и кошек при эктопаразитарных заболеваниях, вызванных блохами (Scleroserhales), вшами (Linognathus), власоседами (Trichodectes) и клещами (Ixodidae).
Дозировка и способ применения: См. листовку-вкладыш.

Препарат Больфо спрей применяют наружно. Перед применением флакон встряхивают и, нажимая на распылитель, в течение нескольких секунд, направляют струю препарата с расстояния 30-40 см на туловище животного против роста шерсти до ее легкого увлажнения. Препарат Больфо спрей уничтожает блох и клещей мгновенно после нанесения. Места обитания животных, подстилки, коврики и другие средства ухода за животными рекомендуют периодически обрабатывать соответствующими инсектицидами.

Противопоказания: Не применять больным и ослабленным животным, животным чувствительным к составным компонентам препарата. Не применять животным до 3-х месячного возраста. Не применять животным с повреждением кожи. Не применять продуктивным животным.

Условия хранения: Препарат хранят в герметичной упаковке производителя в сухом, недоступном для детей и животных, месте отдельно от кормов и продуктов при температуре от 0 до 30 °С. Избегать прямых солнечных лучей при хранении. Не замораживать. Не хранить в холодильнике.

Срок годности: 3 года
Владелец регистрационного свидетельства: Байер Энимал Хелс ГмБХ, D-51368, Лєверкюзен, Германия
Производитель: КВП Фарма и Ветеринар-Продукт ГмБХ, Киль, Германия

Использовать до: см. дату на дне упаковки.

3 335 250 мл

81313725



Легко займиста
речовина!
Легко
воспламеняемо!



4 007221 033141

Bayer

