

Броэстрофан

раствор для инъекций



Состав

1 мл препарата содержит:
клопростенола натрия соль — 0,25 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная.

Фармакологические свойства

Клопростенол — синтетический аналог простагландина F2-альфа, который в период лютеиновой фазы полового цикла вызывает регрессию желтого тела у самок и способствует росту и развитию фолликулов.

Показания

Препарат используют:

- **коровам, нетелям, телкам** — для усиления потуг при осложненных родах, ускорения инволюции матки, при задержании последа, для терапии эндометритов в сочетании с противомикробными средствами, регрессии персистентного желтого тела и кисты желтого тела, стимуляции и синхронизации эструса в период осеменения;
- **свиноматкам** — для стимуляции родов и синхронизации опоросов;
- **кобылам** — для стимуляции эструса и регрессии персистентного желтого тела;
- **сукам, кошкам** — в комплексной терапии хронических эндометритов и для прерывания нежелательной беременности.

Противопоказания

При введении самкам в первую треть беременности существует высокая вероятность ее прерывания.



Способ применения и дозы

Препарат вводят внутримышечно или подкожно.

Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.

Вид животных и заболевания	Доза	Применение
Коровы, нетели, телки:		
осложнения при родах	2 мл на 400 кг массы тела, на каждые 50 кг больше (меньше) указанного веса дозу увеличивают (уменьшают) на 0,3 мл	
функциональные расстройства яичников	2 мл	за 3–3,5 суток до желаемого срока осеменения; при отсутствии признаков течки препарат вводят повторно на 11-й день после первой инъекции, через 3–3,5 суток проводят двукратное осеменение
Свиноматки	0,5–0,7 мл	для индукции опоросов — однократно, начиная с 111-го дня супоросности
Овцы, козы	0,5–0,7 мл	
Кобылы	1 мл	на 4–6 суток наступает наиболее благоприятный срок для спаривания
Суки	0,2–0,3 мл	
Кошки	0,1 мл	для аборта необходимо 3–5 инъекций через каждые 12 часов

Предостережения

При передозировке может возникнуть диарея, рвота, беспокойство, гиперсаливация.

Упаковка

Стеклоампулы по 2 мл (по 10 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +5 до +20 °С.

Срок годности

2 года.