

Брометронид новый порошок

порошок для перорального применения



Состав

1 г препарата содержит:
тинидазол — 250 мг

Описание

Порошок светло-желтого цвета, микрогранулированный, плохо растворяется в воде.

Фармакологические свойства

Тинидазол — синтетический препарат широкого спектра действия на простейших *Balantidium coli*, *Entamoeba histolytica*, *Treponema hyodysenteriae*, *Histomonas meleagridis*, *Lambliа intestinalis*, *Eimeria* spp., *Trichomonas columbae*, *T. gallinae*, бактерицидного действия на анаэробов *Bacteroides* spp., *Fusobacterium* spp., *Clostridium* spp., большинство видов грамположительных и грамотрицательных кокков и пр.

Тинидазол быстро и почти полностью абсорбируется из ЖКТ. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 2 часа и сохраняется в течение 12 часов. Хорошо распределяется во всех тканях организма, биотрансформируется в печени. Около 60% препарата выводится с мочой, 12% — с калом.

Показания

Лечение животных при заболеваниях, которые вызваны микроорганизмами, чувствительными к тинидазолу:

- **птица (голуби, декоративные фазаны)** — гистомоноз, трихомоноз, эймериоз, сальмонеллез;
- **собаки, коты** — лямблиоз, амебиоз, трихомоноз, другие анаэробные инфекции;
- **декоративные кролики** — эймериоз.

Противопоказания

Не назначать курам-несушкам.



Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально, предварительно смешивая с кормом. Дозы препарата для различных видов животных приведены в таблице.

Вид животных	Доза, г		Применение
	на 1 кг корма	на 10 кг массы тела	
Птица (голуби, декоративные фазаны):			
лечение	2		10 дней
Собаки:			
лямблиоз		0,8–1	5 дней
анаэробные инфекции		0,4–0,5	2–3 недели
амебиоз		0,5–0,6	5 дней
Коты:			
лямблиоз, трихомоноз		0,4–0,5	10 дней
Декоративные кролики:			
эймериоз (взрослые животные)		2–3	3 дня
профилактика во время отлучения от матери		1	10 дней

Предостережения

У животных, чувствительных к тинидазолу, могут возникать аллергические реакции в виде лихорадки, крапивницы, рвоты. После прекращения применения препарата эти симптомы исчезают без специального лечения.

После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 7 суток.

Упаковка

Полимерные пакеты по 10, 100, 400 г.

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от 0 до +20 °С.

Срок годности

3 года.