

Бровалевамизол 8%

раствор для инъекций



Состав

1 мл препарата содержит:
левамизола гидрохлорид — 80 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная, без механических включений, со слабым специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Левамизола гидрохлорид — синтетическое соединение из группы имидазотиазолов. Тормозит фермент основного обмена фумаратредуктазу и образование АТФ, парализует нервные узлы, вызывает паралич и гибель нематод в первые 12–24 часа после введения. В печени животных левамизол трансформируется в оксимеркаптозилфенилимидазолидин. Последний оказывает иммуностимулирующее действие на организм млекопитающих и птиц.

Показания

Лечение при нематодозах, вызванных:

- **крупный рогатый скот, овцы, козы** — *Trichostrongylus colubriformis*, *T. axei*, *Ostertagia circumcincta*, *Haemonchus contortus*, *Nematodirus spathiger*, *Oesophagostomum venulosum*, *O. columbianum*, *O. radiatum*, *Bunostomum trigonocephalum*, *Trichuris skrjabini*, *T. ovis*, *T. globulosa*, *Strongyloides papillosus*, *Dictyocaulus filaria*, *D. viviparus*, *Muellerius capillaris*, *Protostrongylus kochi*, *Neoascaris vitulorum* и пр.;
- **свиньи** — *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, *Oesophagostomum dentatum*, *Metastrongylus elongatus*, *M. pudendotectus*, *M. salmi*, *M. pulmonalis*, *M. tschiauricus*, *Ollulanus tricuspis*, *O. suis*, *Strongyloides ransomi*;
- **плотоядные животные** — *Toxocara canis*, *T. cati*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*;
- **птица (куры, гуси, индейки, голуби)** — *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria spp.*, *Trichostrongylus spp.*



Противопоказания

Не назначать самкам в последнюю треть беременности, племенным производителям в период спаривания, курам-несушкам и истощенным животным.

Не использовать вместе с пирантелом, морантелом, фосфорорганическими препаратами, неостигмином.

Способ применения и дозы

Дозы и способы введения препарата для разных видов животных приведены в таблице.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных и птицы на мясо разрешается через 7 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока, можно использовать только для кормления плотоядных животных и изготовления мясокостной муки, а молоко — выпаивать непродуктивным животным. Людям употреблять в пищу молоко и яйца можно через 3 суток.

Упаковка

Стеклянные флаконы по 10, 20, 50, 100 мл, полимерные флаконы по 100 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +1 до +25 °С.

Срок годности

3 года.

Вид животных	Доза, мл/10 кг массы тела	Способ введения	Применение
Крупный рогатый скот	1	п/к (нижняя середина шеи), в/м (область локтевой мышцы)	однократная доза не должна превышать 30 мл, дозу более 15 мл делят на две инъекции и вводят в разные места
Свиньи	1 (при массе до 150 кг) 2,5 (на каждые последующие 50 кг однократно)	п/к (область коленной складки или за ухом), в/м	дозу более 10 мл делят на две инъекции и вводят с левой и правой стороны
Овцы, козы	1 (при массе до 50 кг) 6 (при массе свыше 50 кг, однократно)	п/к	однократно
Собаки	1	в/м, перорально	однократно
Птица	3–4	перорально с водой	однократно или делят и дают 3–4 дня
Голуби	1 мл на 200 мл воды	перорально с водой	3–5 дней