

Бровалевамизол 8% порошок

порошок для перорального применения



ВОДО-РАСТВОРИМЫЙ



Состав

1 г препарата содержит:
леваamisола гидрохлорид — 80 мг

Описание

Порошок белого или желтоватого цвета, растворяется в воде.

Фармакологические свойства

Левамизола гидрохлорид — синтетическое соединение из группы имидазотиалов. Тормозит фермент основного обмена фумаратредуктазу и образование АТФ, парализует нервные узлы, вызывает паралич и гибель нематод в первые 12–24 часа после введения. В печени животных трансформируется в оксимеркаптоэтилфенилимидазолидин. Последний оказывает иммуностимулирующее действие на организм млекопитающих и птиц.

Показания

Лечение животных и птицы при нематодозах, вызванных:

- **крупный рогатый скот, овцы, козы** — *Trichostrongylus colubriformis*, *T. axei*, *Ostertagia circumcincta*, *Haemonchus contortus*, *Nematodirus spathiger*, *Oesophagostomum venulosum*, *O. columbianum*, *O. radiatum*, *Bunostomum trigonocephalus*, *Trichuris skrjabini*, *T. ovis*, *T. globulosa*, *Strongyloides papillosus*, *Dictyocaulus filaria*, *D. viviparus*, *Muellerius capillaris*, *Protostrongylus kochi*, *Neoascaris vitulorum* и пр.;
- **свиньи** — *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, *Oesophagostomum dentatum*, *Metastrongylus elongatus*, *M. pudendotectus*, *M. salmi*, *M. pulmonalis*, *M. tschiauricus*, *Ollulanus tricuspis*, *O. suis*, *Strongyloides ransomi*;
- **плотоядные животные** — *Toxocara canis*, *T. cati*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*;
- **птица (куры, гуси, индейки, голуби)** — *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria spp.*, *Trichostrongylus spp.*

Противопоказания

Не назначать самкам в последнюю треть беременности, племенным производителям в период спаривания, курам-несушкам и истощенным животным.

Не использовать вместе с пирантелом, морантелом, фосфорорганическими препаратами, неостигмином.



Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально с водой или кормом в следующих дозах:

- **крупный рогатый скот, овцы, свиньи, собаки** — 1 г на 10 кг массы тела, однократно;
- **домашняя птица** — 3–4 г на 10 кг массы тела, однократно с водой или разделить расчетную дозу на 3–4 дня;
- **голуби** — 1 г препарата растворить в 200 мл воды и давать 3–5 дня вместо обычной воды.

Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 7 суток, птицы — через 3 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока, можно использовать только для кормления плотоядных животных и изготовления мясокостной муки, а молоко — выпаивать непродуктивным животным. Людям употреблять в пищу молоко и яйца можно через 3 суток.

Упаковка

Полимерные пакеты по 25, 500 г.

Условия хранения

В сухом месте при температуре от +1 до +25 °С.

Срок годности

3 года.