

Брованол М

таблетки для перорального применения



Состав

1 г препарата (1 таблетка) содержит:
 никлозамид — 92 мг
 оксбендазол — 12 мг
 левамизол гидрохлорид — 16 мг

Описание

Таблетки желтого цвета, круглой цилиндрической формы, плоские, со слабым специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Противопаразитарный препарат широкого спектра действия. Никлозамид при пероральном применении не всасывается из ЖКТ и при контакте с ленточными гельминтами тормозит оксидационно-фосфоролитические процессы, приводит к ослаблению и быстрой гибели сколексов и сегментов паразитов, которые частично перевариваются и выводятся из организма животных. Оксбендазол нарушает метаболизм глицидов у нематод, блокируя образование АТФ, что вызывает паралич и гибель паразитов всех стадий развития уже через несколько часов после введения препарата. Левамизол усиливает нематодоцидное действие оксбендазола, является эффективным иммуномодулятором. При дальнейшей вакцинации способствует образованию поствакцинального иммунитета высокого уровня.

Показания

Лечение и профилактика **собак и кошек** от смешанных инвазий ЖКТ, вызванных личинками и взрослыми гельминтами: *Ancylostoma caninum*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllobothrium latum*, *D. minus*, *Toxocara canis*, *T. cati*, *Toxascaris leonina*, *Trichocephalus vulpis*, *Taenia hydatigena*, *T. multiceps*, *Uncinaria stenocephala* и пр.

Если у собак одновременно с гельминтозом подтверждается эктопаразитоз (блохи, вши, клещи), то вместо Брована М следует применять Брованол плюс.

Противопоказания

Не назначать животным с атонией кишечника.



Способ применения и дозы

Терапевтическая доза для **щенков и котят** — 1 таблетка на 4 кг массы тела. Расчетную дозу делят на две части и дают с интервалом в сутки. Щенкам первую дегельминтизацию проводят накануне вакцинации в возрасте 4–5 недель, котят — в возрасте 6 недель. В дальнейшем препарат желательно применять профилактически в указанных дозах каждые 3–4 месяца.

Предостережения

Не превышать рекомендованных доз. У некоторых животных при сильной инвазии вследствие интоксикации переваренными частями гельминтов возможно появление крапивницы и зуда в области ануса, диареи, рвоты, беспокойства. Эти симптомы быстро исчезают без специального лечения.

Упаковка

Полимерные блистеры по 10 таблеток (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +1 до +25 °С.

Срок годности

3 года.