

Бровитакокцид

порошок для перорального применения



ВОДО-РАСТВОРИМЫЙ



Состав

1 г препарата содержит:
ампролиума гидрохлорид — 125 мг
викасол — 2 мг
витамин А — 10 000 ME

Описание

Порошок белого или желтоватого цвета, микрогранулированный, со специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Ампролиума гидрохлорид угнетает развитие кокцидий на стадии шизогонии первой и второй генерации, является антагонистом витамина В₁, не препятствует наработке иммунитета против кокцидоза. Викасол и витамин А повышают функциональные способности эпителия и уменьшают кровоизлияния на слизистой оболочке кишечника.

Показания

Лечение и профилактика животных при поражении эймериями:

- **телята** — *E. bovis*, *E. cylindrical*, *E. ellipsoidae*, *E. zuernii*, *Cryptosporidium muris*, *C. parvus*;
- **овцы, козы** — *E. arloigni*, *E. faurei*, *E. intricata*, *E. ninaekohljakimovae*;
- **свиньи** — *E. debliecki*, *E. scabra*, *E. spinosa*, *E. suis*, *Isospora suis*;
- **кролики** — *E. magna*, *E. perforans*, *E. stiedae*;
- **плотоядные животные** — *Isospora canis*, *I. ohioensis*, *I. rivolta*, *I. felis*;
- **куры** — *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella*;
- **индейки** — *E. adenoeides*, *E. meleagrimitis*;
- **фазаны** — *E. colchii*;
- **гуся** — *E. anseria*, *E. nocens*, *E. truncate*;
- **голуби** — *E. labbeana*.

Противопоказания

Не назначать курам-несушкам и щенкам в возрасте до 1 месяца.

Способ применения и дозы

Перед использованием препарат смешивают с суточной нормой воды либо корма.

Вид животных и заболевания	Доза, г		Применение
	на 10 кг массы тела	на 1 л воды или 1 кг корма	
Телята:			
эймериоз	1		5–10 дней
криптоспориديоз	1,5		5–10 дней
профилактика	0,4–0,5		21 день
Овцы, козы:			
лечение	4		5 дней
профилактика	0,6		21 день
Свиньи:			
лечение	2–4		5 дней
профилактика	0,4		4–8 недель
Кролики:			
лечение		2–2,5 (вода)	4–5 дней
профилактика		1 (вода)	21 день
Собаки, коты:			
лечение	2		7–10 дней
профилактика (суки)		6	за 10 суток до родов
Вид животных и заболевания	Доза, г на 2 л воды либо 1 кг корма		Применение
Куры, индейки, гуся, голуби, фазаны:			
лечение	2		5–10 дней
профилактика:			
• цыплята в возрасте до 2 мес.	0,9–1		весь период выращивания
• цыплята в возрасте до 4 мес.	0,7		
• до начала яйценоскости	0,4		
• цыплята мясных пород, индюшата	1		
• гусята, голуби, фазаны	1		

Предостережения

После последнего введения лечебной дозы препарата забой животных на мясо разрешается через 14 суток, птицы — через 7 суток, после профилактической дозы — через 2 суток.

Упаковка

Полимерные пакеты по 10 г, 1 кг, полимерные контейнеры по 30 г.

Условия хранения

В сухом, темном месте, при температуре от +4 до +20 °С.

Срок годности

1 год.