

# ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК



## Применение:

«Четыре с хвостиком» таблетки для регуляции половой охоты применяют сукам для задержки и прерывания течки, а также кобелям для снижения половой активности и коррекции поведения.

## Форма выпуска:

Таблетки – по 10 таблеток в блистере, упакованные в картонные пачки.

## Преимущества:

- Коррекция полового поведения животного без хирургического вмешательства.
- Снижение хлопот, связанных с половым поведением животного, у его владельца.
- Возможность в любой момент прервать курс применения препарата и восстановить половой цикл.

## Состав и фармакологические свойства.

«Четыре с хвостиком» капли для регуляции половой охоты в 1 мл содержит в качестве действующего вещества мегестрола ацетат – 20 мг.

«Четыре с хвостиком» таблетки в 1 таблетке содержит в качестве действующего вещества мегестрола ацетат – 5 мг.

Механизм действия мегестрола ацетата заключается в воздействии на гипоталамо-гипофизарную систему, блокаде секреции аденогипофизом гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ). Снижение уровня гонадотропных гормонов в крови приводит к нарушению фолликулогенеза у самок, вследствие чего не происходит созревание фолликулов и их овуляция, угнетению гиперплазии клеток и секреции молочной железы. Снижение уровня гонадотропных гормонов в крови подавляет гормонозависимые новообразования. Применение препарата приводит к снижению уровней тестостерона в организме кобелей и котов и эстрогена в организме сук и кошек и, как следствие, угнетению половой охоты. При отмене препарата концентрация мегестрола ацетата в организме снижается, восстанавливается нормальный уровень ЛГ и ФСГ в крови животного, прекращается контрацептивное действие препарата и восстанавливается половой цикл.

## Показания к применению.

«Четыре с хвостиком» капли для регуляции половой охоты и таблетки применяют сукам и кошкам для задержки и прерывания течки, а также кобелям и котам для снижения половой активности и коррекции поведения.

## Противопоказания.

Применение препаратов противопоказано: сукам и кошкам начиная с 3 суток от начала течки; неполовозрелым, беременным и лактирующим животным, а также животным обоего пола при заболеваниях половой системы, опухолях молочных желез, сахарном диабете, гормональных нарушениях и индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата.

## Дозы и порядок применения.

«Четыре с хвостиком» капли для регуляции половой охоты и таблетки применяют животным, индивидуально за 1-2 часа до кормления, принудительно на корень языка или с лакомством согласно указанной схеме. Кошкам назначают «Четыре с хвостиком» капли для регуляции половой охоты у кошек и таблетки по следующей схеме (таблица 1):

Цель дачи препарата	Срок	Форма препарата	Доза препарата	Длительность
для прерывания течки	не позднее 3 суток после начала течки	Капли	ежедневно, по 6 капель (0,3 мл)	в течение 8 дней
		Таблетки	ежедневно, по 1 таблетке	в течение 8 дней
для задержки течки	начать в период анэструса	Капли	по 6 капель (0,3 мл) 1 раз в 2 недели	не более 18 месяцев
		Таблетки	по 1 таблетке один раз в 2 недели	не более 18 месяцев

Перед началом нового курса применения рекомендуется сделать перерыв сроком не менее 2-х месяцев. Повторение курса возможно после проявления у кошки нормального физиологического полового цикла. В случае трудности определения начала течки, рекомендуется лучше задержать ее, чем прервать.

Сукам, в зависимости от массы тела, назначают «Четыре с хвостиком» капли для регуляции половой охоты и таблетки по следующей схеме:

- для задержки течки препарат начинают давать за 7-15 дней до начала течки. Дозировка с учетом массы животного представлена в таблице 2. Длительность применения зависит от желаемого срока задержки течки, но не более 32 дней. Течка может начаться через несколько дней после прекращения дачи препарата. При длительном применении препарата (около месяца), течка обычно начинается через 4-6, иногда через 2-9 месяцев.

Таблица 2

Дозировка «Четыре с хвостиком» капли для регуляции половой охоты с целью задержки течки у сук в зависимости от массы животного.

Масса животного, кг	Суточная доза мегестрола ацетата, мг	Суточная доза		Суточная доза препарата, таблеток
		капель	мл	
До 5	2,5	3	0,15	0,5
6-10	5	6	0,25	1
11-15	7,5	8	0,4	1,5
16-20	10	10	0,5	2
21-30	15	15	0,75	3
31-40	20	20	1	4
41-50	25	25	1,25	5
51-60	30	30	1,5	6

- для прерывания течки дают при появлении первых ее признаков (не позднее 3 суток после ее начала). Дозировка с учетом массы животного представлена в таблице 3. В течение первых трех дней курса дают суточную дозу, затем в течение последующих семи дней половину суточной дозы. После прекращения дачи средства течка обычно начинается через 4-6, иногда через 2-9 месяцев.

Таблица 3

Дозировка «Четыре с хвостиком» капли для регуляции половой охоты с целью прерывания течки у сук в зависимости от массы животного.

Масса животного, кг	Суточная доза мегестрола ацетата, мг	Суточная доза препарата		Суточная доза препарата, таблеток
		капель	мл	
До 5	10	10	0,5	2
6-10	20	20	1	4
11-15	30	30	1,5	6
16-20	40	40	2	8
21-30	60	60	3	12
31-40	80	80	4	16
41-50	100	100	5	20
51-60	120	120	6	24

Сукам лекарственный препарат рекомендуется применять не более двух раз в год.

Самцам для снижения половой активности и коррекции поведения препарат применяют в следующих дозах:

- котам 1 таблетка на животное ежедневно в течение 5-7 дней, затем 1 раз в неделю до достижения коррекции поведения;
- кобелям 1 таблетка на 2,5 кг массы животного ежедневно в течение первых 7 дней, следующие 14 дней – половина суточной дозы.

## Побочные явления.

При применении «Четыре с хвостиком» капель для регуляции половой охоты и таблеток в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможно повышение массы тела, а также появление незначительного угнетения или агрессивности.

В случае передозировки возможно развитие патологических изменений в тканях матки и яичников, незначительное повышение массы животного, повышение аппетита, апатичность, незначительная гипертрофия молочных желез.

## Хранение.

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, при температуре от 2°C до 25°C. Срок годности капель – 2 года, таблеток – 3 года со дня производства.

## Форма выпуска.

Флаконы-капельницы по 5 мл и 2 мл; таблетки – по 10 таблеток в блистере, упакованные в картонные пачки.