

ЦИПРОВЕТ 5% РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ



Применение:

Антибактериальное лекарственное средство

Форма выпуска:

Флакон из темного стекла 50 мл и 100 мл.

Преимущества

- Антибиотик плюс антиоксидант.
- Широкий спектр чувствительных микроорганизмов, включая хламидии и микобактерии.
- Эффективен при острых и хронических формах заболевания.
- Низкая токсичность для клеток макроорганизма.

Состав и фармакологические свойства.

Содержит в качестве действующего вещества цiproфлoксацин - 50 мг/мл, и янтарную кислоту - 10 мг/мл, как вспомогательное вещество. Цiproфлoксацин - антибиотик группы фторхинолонов, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Proteus* spp., *Yersinia* spp., *Haemophilus* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Pasteurella multocida*, *Plesiomonas shigelloides*, *Campylobacter jejuni*, *Brucella* spp., *Chlamydia trachomatis*, *Listeria monocytogenes*, *Mycobacterium* spp., *Corynebacterium diphtheriae*, *Staphylococcus* spp. и *Streptococcus* spp. Янтарная кислота является естественным антиоксидантом.

Показания к применению.

Лечение собак и кошек при инфекционных болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы, суставов, мягких тканей и кожи, пупочных инфекциях, атрофическом рините, бронхопневмонии, колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, микоплазмозах, других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к цiproфлoксацину.

Крупному рогатому скоту, овцам, козам, свиньям при инфекционных болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы, суставов, мягких тканей и кожи, некробактериозе, пупочных инфекциях, атрофическом рините, бронхопневмонии, колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, микоплазмозе, синдроме мастит-метрита-галактия (ММА) и других инфекциях, возбудители которых чувствительны к цiproфлoксацину.

Противопоказания.

Дойным животным, беременным и кормящим самкам, животным с заболеваниями почек и печени и нарушениями развития хрящевой ткани, при поражениях нервной системы, а также щенкам и котятм до окончания периода роста. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к фторхинолонам. Не применять одновременно с бактериостатическими антибиотиками (левомицетином, макролидами и тетрациклинами), теофилином и нестероидными противовоспалительными средствами.

Порядок применения.

Вводят собакам и кошкам 1 мл на 10 кг массы тела подкожно в течение 5-10 дней.

«Цiproвет 5% для инъекций» вводят сельскохозяйственным животным подкожно или внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы животного (5 мг цiproфлoксацина на 1 кг массы животного), один раз в сутки в течение 3-5 дней, свиньям при синдроме ММА в течение 2 дней.

Максимальный объем «Цiproвета 5% для инъекций» для введения в одно место не должен превышать для крупного рогатого скота – 15 мл, свиней – 10 мл, овец и телят – 5 мл, поросят – 2,5 мл, собак – 2 мл и кошек – 1 мл.

Побочные явления.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к фторхинолонам возможен отказ от корма, рвота, отеки, нарушение координации движений. При появлении побочных явлений использование лекарственно- го средства прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

Период ожидания.

Убой на мясо крупного и мелкого рогатого скота разрешается не ранее, чем через 28 суток, свиней – не ранее, чем через 14 суток после последнего применения лекарственного средства.

Хранение.

Хранить препарат в упаковке производителя, в защищенном от света месте, недоступном для детей и животных, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5 до 25°С.

Форма выпуска.

Флакон из темного стекла 50 мл и 100 мл.