

GMP
CERTIFIED



[← Назад в каталог](#)

КарпроПЕТ

1. Общие сведения

1.1 КарпроПЕТ (CarproPET)

1.2 Одна таблетка массой 320 мг содержит: 40,0 мг карпрофена и вспомогательные вещества.

1.3 По внешнему виду препарат представляет собой таблетки круглой формы от бежевого до коричневого цвета с легким специфическим запахом, с разделительной бороздкой посередине.

- 1.4 Выпускается в таблетках массой и 0,32 г, расфасованных по 30 и 100 штук в пластиковые банки соответствующей вместимости с контролем вскрытия.
- 1.5 Срок годности таблеток в закрытой потребительской таре 36 месяцев от даты изготовления. Хранят при температуре от 0°C до + 25°C и относительной влажности не более 75%.

2. Фармакологические свойства

- 2.1 Фармакологические свойства препарата обусловлены карпрофеном входящими в его состав. КарпроПЕТ относящийся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, обладает противовоспалительным, анальгетическим и жаропонижающим действием.

КарпроПЕТ в цикле арахидоновой кислоты преимущественно ингибирует циклоксигеназу – II, которая вырабатывается в организме в ответ на развитие воспаления. В результате блокируется синтез воспалительных простагландинов, вызывающих воспаление, отек и боль. В терапевтических дозах КарпроПЕТ значительно слабее действует на циклоксигеназу – I, и благодаря этому не оказывает влияния на синтез протективных простагландинов. КарпроПЕТ не препятствует нормальным физиологическим процессам в тканях, особенно в желудке, кишечнике, почках и тромбоцитах, быстро всасывается из желудочно – кишечного тракта, достигает пика концентрации в плазме крови через 1-3 часа после введения, при биодоступности более 90%. Время полувыведения у собак составляет около 8 часов. КарпроПЕТ более чем на 99% связывается с белками плазмы крови.

- 2.2 Метаболизируется препарат в печени, выделяется с фекалиями (около 80%), а также с мочой.

3. Порядок применения препарата

- 3.1 КарпроПЕТ назначают собакам для облегчения воспалительных и болевых явлений при острых и хронических опорно – двигательного аппарата (остеоартриты), для анальгезии и в качестве противовоспалительного средства для уменьшения послеоперационных болей и отеков.

- 3.2 КарпроПЕТ таблетки применяют только внутрь. В начале лечения суточная доза составляет 4 мг карпрофена на 1 кг массы тела (1 таблетка КарпроПЕТ содержащая 40 мг карпрофена, на 10 кг веса животного)

Рекомендуется распределить суточную дозу на две равные части. После 7 дней лечения в зависимости от клинических показаний суточную дозу можно уменьшить до 2 мг/кг массы тела в день (1 таблетка 40 мг на 20 кг веса животного) на 1 введение. Длительность терапии зависит от состояния животного, но после 14 дней лечения животное должно быть снова осмотрено ветеринарным врачом.

4. Побочные действия

4.1 В редких случаях может возникнуть раздражение слизистой оболочки желудка и рвота.

5. Противопоказания

5.1 Гиперчувствительность к карпрофену.

5.2 Не принимать щенным сукам.

5.3 Препарат следует назначать с осторожностью животным с заболеваниями сердца, почек и печени.

5.4 Не рекомендуется назначать другие нестероидные противовоспалительные средства или нефротоксичные препараты ранее, чем через 24 часа после введения КарпроПЕТ.

6. Особые указания

6.1 Не превышать установленную дозу или продолжительность лечения.

6.2 При одновременном использовании КарпроПЕТ и Варфарина необходимо тщательно контролировать клиническую ситуацию, поскольку оба этих препарата связываются с белками плазмы крови.

[in English](#)

[Latviešu](#)

[Формула сайтов](#)