

Цефтиомаст (суспензия для интрацистерального применения)

ингредиенты: ЦЕФТИОФУРА ГИДРОХЛОРИД

применение: ИНТРАМАММАРНОЕ

тип препарата: АНТИБИОТИК

ОПИСАНИЕ

Маслянистая суспензия от желтовато-белого до светло-коричневого цвета.

СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующее вещество:

цефтиофура гидрохлорид - 50,0 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефтиофура относится к группе цефалоспоринов третьего поколения. Он активен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая штаммы, продуцирующие бета-лактамазы, и некоторые анаэробные бактерии: *Escherichia coli*, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, *Salmonella choleraesuis*, *Streptococcus suis*, *Streptococcus zooepidemicus*, *Pasteurella* spp., *Staphylococcus* spp., *Actinomyces pyogenes*, *Salmonella typhimurium*, *Streptococcus agalactiae*, *S. dysgalactiae*, *S. bovis*, *Klebsiella* spp., *Citrobacter* spp., *Enterobacter* spp., *Bacillus* spp., *Proteus* spp., *Fusobacterium necrophorum* и *Porphyromonas assacharolytica* (*Bacteroides melaninogenicus*). Механизм действия антибиотика заключается в подавлении синтеза клеточной стенки бактерий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Лечение коров в сухостойный период больных субклинической формой маститов бактериальной этиологии, вызванных чувствительными к цефтиофуру микроорганизмами.

ДОЗИРОВКА

После последнего сцеживания содержимое одной шприц-тубы вводят через доечный канал в каждую инфицированную четверть молочной железы, которую предварительно выдаивают и дезинфицируют. После введения препарата

четверть молочной железы массируют для равномерного распределения его по всему вымени.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять животным с повышенной чувствительностью к цефтиофуру или другим бета-лактамам антибиотикам.

Не применять коровам, у которых сухостойных период менее 4 недель.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не употреблять молоко в течение 28 дней до отела. Если сухостойных период составляет 30 суток и более, то после отела молоко можно использовать для употребления в пищу людям без ограничений. Запрещается убой животных на мясо во время лечения. Потребление мяса в пищу разрешается через 16 суток после последнего введения препарата. До указанного срока мясо скармливают непродуктивна животным или утилизируют.

ФОРМА ВЫПУСКА

Картонные коробки, содержащие 20 полимерных шприц-туб по 10 мл.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности - 18 месяцев.

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 10 до 25 ° С.