

# Цифлур

раствор 1% для наружного применения



## Состав

1 мл препарата содержит:  
цифлутрин – 10 мг

## Описание

Жидкость желтого цвета, прозрачная, маслянистая.

## Фармакологические свойства

Препарат обладает контактным инсектицидным и репеллентным действием.

Цифлутрин относится к группе синтетических пиретроидов второго типа, которые нарушают работу натриевых каналов нервных клеток эктопаразитов, что приводит к задержке реполяризации мембран, торможению нервных импульсов, нарушению координации движений, параличу и гибели насекомых.

После нанесения незначительное количество препарата всасывается, что обеспечивает его длительное инсекто-акарицидное и репеллентное действие.

Препарат малотоксичен для теплокровных животных и в рекомендуемых дозах не дает резорбтивно-токсического и раздражающего эффекта.

## Показания

Защита **крупного рогатого скота** в пастбищный период и **собак** в период активности эктопаразитов: зоофильных мух *Haematobia stimulans*, *Lyperosia irritans*, *L. titilans*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca autumnalis*, *M. larvipara*, *M. amica* и пр., кровососущих комаров *Aedes*, *Anopheles*, *Culex*, мошек *Boopthora*, *Simulium*, *Schaenbaueria*, мокрецов *Culicoides*, *Forcipomya*, *Zentozoonops*, слепней *Chrysops*, *Haematopota*, *Tabanus*, оводов *Hypoderma bovis*, *H. lineatum*, гнуса, иксодовых клещей, блох *Stenocephalides canis*, вшей *Linognathus setotus*, власоедов *Trichodectes canis* и пр.

## Противопоказания

Не назначать телятам с массой тела до 100 кг, щенкам до 2 месяцев, сукам в первой половине беременности.

НОВИНКА



НЕ ВЫВОДИТСЯ  
С МОЛОКОМ



## Способ применения и дозы

Препарат наносят на сухую, чистую, неповрежденную кожу таким образом:

- **крупный рогатый скот** – 5 мл на 1 животное массой до 300 кг и 10 мл на 1 животное массой свыше 300 кг, медленно втирают вдоль позвоночника от холки до крестца при температуре воздуха не выше +25 °С, после чего в течение 3 часов избегают попадания воды на места нанесения препарата; дойных коров обрабатывают после вечернего доения; наилучший защитный эффект достигается при обработке всего поголовья скота весной после выгона на пастбище и повторных обработках через каждые 4–6 недель;
- **собаки** – 1 мл на 10 кг массы тела наносят и слегка втирают в область холки в период активности клещей и других насекомых; повторные обработки проводят не ранее чем через 4 недели.

## Предостережения

Контактирующий с препаратом персонал должен соблюдать общие правила гигиены и безопасности, принятые при работе с ветеринарными препаратами, и использовать защитную одежду (халат, шапочка, резиновые сапоги, перчатки). После окончания работ руки тщательно вымыть теплой водой с мылом. При попадании препарата на кожу, слизистые оболочки или в глаза промыть их большим количеством проточной воды.

При использовании в рекомендуемых дозах ограничения по употреблению мяса и молока крупного рогатого скота отсутствуют.

## Упаковка

Полимерные пипетки по 10 мл (по 4 шт. в картонной упаковке), полимерные флаконы по 500 мл с дозирующей емкостью объемом 10 мл.

## Условия хранения

В упаковке производителя, в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей и животных месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от +8 до +25 °С.

После вскрытия флакона препарат хранить плотно закрытым и использовать в течение 2 месяцев.

## Срок годности

2 года.