

25.04.2018

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Дронтал® плюс XL зі смаком м'яса

2. Склад

1 таблетка містить діючі речовини:

фебантел - 525,0 мг;

пірантелу ембонат - 504,0 мг;

празіквантел - 175,0 мг.

Допоміжні речовини: кукурудзяний крохмаль, моногідрат лактози, мікрокристалічна целюлоза, повідон, магнію стеарат, натрію лаурилсульфат, колоїдний діоксид кремнію, кроскармелоза натрію, м'ясний ароматизатор.

3. Фармацевтична форма

Таблетки

4. Фармакологічні властивості

АТС vet QP52 антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51, празіквантел, комбінації)

1. Фармакодинаміка

Дронтал® Плюс XL зі смаком м'яса - антигельмінтик, ефективний проти круглих та стьожкових гельмінтів, а також лямблій. Містить діючі речовини: фебантел, пірантелу ембонат, празіквантел.

Комбінація діючих речовин *пірантелу* та *фебантелу*, що входять до складу препарату, мають синергічну дію проти нематод (аскарид, унцинарій та анкілостом, волосоголовців) у собак: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, а також проти лямблій *Giardia spp.*

Празіквантел активний проти цестод у собак: *Taenia species*, *Dipilidium caninum*, *Echinococcus granulosus* та *Echinococcus multilocularis*. Празіквантел діє проти всіх кишкових стадій цих паразитів.

2. Фармакокінетичні властивості

Пірантел діє як холінергічний антагоніст ацетилхолінових рецепторів, викликаючи спастичний параліч круглих гельмінтів шляхом деполаризуючої нервово-м'язової блокади.

Антигельмінтна ефективність та лямбліоцидний ефект фебантелу зумовлений його здатністю гальмувати процес полімеризації тубуліну в мікроканальцях. У результаті структурних та функціональних метаболічних розладів виснажуються енергетичні запаси паразитів, внаслідок чого настає їх загибель на 2-3 добу.

Празіквантел швидко всмоктується через зовнішню оболонку стьожкових гельмінтів, внаслідок чого настає її пошкодження та скорочення. Це призводить до руйнування зовнішньої оболонки, розладів метаболізму і загибелі паразита.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Собаки.

5.2 Показання до застосування

Лікування інвазії круглими і стьожковими гельмінтами у собак:

круглими гельмінтами: імаго *Toxocara canis*, *T. leonina*, *Uncinaria Stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*.

Стьожкові гельмінти: імаго *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp.*

Лікування лямбліозу (*Giardia spp.*) у собак та цуценят.

5.3 Протипоказання

Не застосовувати тваринам з гіперчутливістю до складників препарату.

Не застосовувати собакам масою тіла менше 7 кг.

5.4 Побічна дія

У дуже рідких випадках (<1 з 10000) можливі легкі та швидкоминучі розлади шлунково-кишкового тракту (наприклад, блювота).

5.5 Особливі застереження при використанні

Блохи слугують проміжними хазяїнами для стьожкових гельмінтів *Dipylidium caninum*, тому для запобігання повторного зараження тварин дипілідіозом слід вжити заходів щодо контролю переносників захворювань, таких як блохи та миші, в оточенні тварини.

Для запобігання повторного зараження всі тварини, що утримуються разом, повинні проходити дегельмінтизацію одночасно.

Прибирання та гігієна після дегельмінтизації вкрай важливі для профілактики повторного зараження та розповсюдження інвазії. Слід вимити та продезінфікувати предмети, які можуть бути забруднені фекаліями.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Пепарат не застосовують самкам у перші два триместри вагітності.

Застосування препарату протягом 3-х днів поспіль для лікування лямбліозу під час третього триместру вагітності повинно ґрунтуватися на оцінці лікарем ветеринарної медицини ризику та необхідності лікування.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовують одночасно з препаратами на основі піперазину.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Рекомендована доза - 1 таблетка на 35 кг маси тіла тварини (15 мг фебантелу, 14,4 мг пірантелу ембонату та 5 мг празіквантелу на 1 кг маси тіла).

Маса тіла, кг	Кількість таблеток
7-17,5	½
>17,5 - 35	1
>35 – 52,5	1 ½
>52,5 - 70	2

На кожні наступні 17,5 кг маси тіла застосовувати додатково половину таблетки.

Застосування: перорально, таблетку задають з кормом або без.

Застосування препарату не вимагає дотримання дієти.

Тривалість лікування: одноразово. При високому ступені інвазії шлунково-кишковими нематодами або при ехінококозі можлива необхідність повторного застосування (за призначенням лікаря ветеринарної медицини).

Лікування інвазій спричинених лямбліями (*Giardia spp.*): препарат застосовують три дні поспіль у рекомендованих дозах.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

При передозуванні собакам та цуценятам рекомендованої дози препарату у 10 разів побічних реакцій не виявлено.

5.10 Спеціальні застереження

Часте використання антигельмінтних препаратів будь-якого класу може призвести до виникнення резистентності до діючої речовини.

5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин не визначають.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Після застосування препарату слід помити руки водою.

Giardia spp. може уражати людей, тому зверніться до лікаря, якщо у Вашого собаки виявлене зараження лямбліями.

При випадковому заковтуванні препарату зверніться до лікаря та покажіть листівку вкладку до препарату.

25.04.2018

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Невідомо.

6.2 Термін придатності

3 роки.

Термін придатності після розкриття первинної упаковки з фольги (або розділених таблеток) – 7 діб.

6.3 Особливі заходи зберігання

Зберігати препарат у сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 25 °С.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Блістери з фольги по 2, 4, 24 та 104 таблетки, запаковані у картонні коробки.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат та його залишки утилізують відповідно до чинного законодавства.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH (Germany)
D-51368, Leverkusen

8. Назва і місце знаходження виробника

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,
Проєнсдорфер Стр. 324,
D-24106 Кіль, Німеччина

KVP Pharma and Veterinar-Produkt GmbH
(Germany)
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel

9. Додаткова інформація

25.04.2018

Дронтал® плюс XL зі смаком м'яса
(таблетки)
листівка-вкладка

Опис

Таблетки продовгуватої форми блідо-жовтого кольору зі смаком м'яса, поділені рисою на дві рівні частини.

Склад

1 таблетка містить діючі речовини:

фебантел - 525,0 мг;

пірантелу ембоат - 504,0 мг;

празіквантел - 175,0 мг.

Допоміжні речовини: кукурудзяний крохмаль, моногідрат лактози, мікрокристалічна целюлоза, повідон, магнію стеарат, натрію лаурилсульфат, колоїдний діоксид кремнію, кроскармелоза натрію, м'ясний ароматизатор.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP52 антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51, празіквантел, комбінації)

1. Фармакодинаміка

Дронтал® Плюс XL зі смаком м'яса - антигельмінтик, ефективний проти круглих та стьожкових гельмінтів, а також лямблій. Містить діючі речовини: фебантел, пірантелу ембонат, празіквантел.

Комбінація діючих речовин *пірантелу* та *фебантелу*, що входять до складу препарату, мають синергічну дію проти нематод (аскарид, унцинарій та анкілостом, волосоголовців) у собак: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, а також проти лямблій *Giardia spp.*

Празіквантел активний проти цестод у собак: *Taenia species*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus* та *Echinococcus multilocularis*. Празіквантел діє проти всіх кишкових стадій цих паразитів.

2. Фармакокінетичні властивості

Пірантел діє як холінергічний антагоніст ацетилхолінових рецепторів, викликаючи спастичний параліч круглих гельмінтів шляхом деполаризуючої нервово-м'язової блокади.

Антигельмінтна ефективність та лямбліоцидний ефект фебантелу зумовлений його здатністю гальмувати процес полімеризації тубуліну в мікроканальцях. У результаті структурних та функціональних метаболічних розладів виснажуються енергетичні запаси паразитів, внаслідок чого настає їх загибель на 2-3 добу.

Празіквантел швидко всмоктується через зовнішню оболонку стьожкових гельмінтів, внаслідок чого настає її пошкодження та скорочення. Це призводить до руйнування зовнішньої оболонки, розладів метаболізму і загибелі паразита.

Застосування

Лікування інвазії круглими і стьожковими гельмінтами у собак:

круглими гельмінтами: імаго *Toxocara canis*, *T. leonina*, *Uncinaria Stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*.

Стьожкові гельмінти: імаго *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp.*

Лікування лямбліозу (*Giardia spp.*) у собак та цуценят.

Дозування

Рекомендована доза - 1 таблетка на 35 кг маси тіла тварини (15 мг фебантелу, 14,4 мг пірантелу ембонату та 5 мг празіквантелу на 1 кг маси тіла).

Маса тіла, кг	Кількість таблеток
7-17,5	½
>17,5 - 35	1
>35 - 52,5	1 ½

25.04.2018

>52,5 - 70	2
------------	---

На кожні наступні 17,5 кг маси тіла застосовувати додатково половину таблетки.

Застосування: перорально, таблетку задають з кормом або без.

Застосування препарату не вимагає дотримання дієти.

Тривалість лікування: одноразово. При високому ступені інвазії шлунково-кишковими нематодами або при ехінококозі можлива необхідність повторного застосування (за призначенням лікаря ветеринарної медицини).

Лікування інвазій спричинених лямбліями (*Giardia spp.*): препарат застосовують три дні поспіль у рекомендованих дозах.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з гіперчутливістю до складників препарату.

Не застосовувати собакам масою тіла менше 7 кг.

Препарат не застосовують самкам у перші два триместри вагітності.

Застереження

Часте використання антигельмінтних препаратів будь-якого класу може призвести до виникнення резистентності до діючої речовини.

Блохи слугують проміжними хазяїнами для стьожкових гельмінтів *Dipylidium caninum*, тому для запобігання повторного зараження тварин дипілідіозом слід вжити заходів щодо контролю переносників захворювань, таких як блохи та миші, в оточенні тварини.

Для запобігання повторного зараження всі тварини, що утримуються разом, повинні проходити дегельмінтизацію одночасно.

Прибирання та гігієна після дегельмінтизації вкрай важливі для профілактики повторного зараження та розповсюдження інвазії. Слід вимити та продезінфікувати предмети, які можуть бути забруднені фекаліями.

Після застосування препарату слід помити руки водою.

Giardia spp. може уражати людей, тому зверніться до лікаря, якщо у Вашого собаки виявлене зараження лямбліями.

При випадковому заковтуванні препарату зверніться до лікаря та покажіть листівку вкладку до препарату.

Форма випуску

Блістери з фольги по 2, 4, 24 та 104 таблетки, запаковані у картонні коробки.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH (Germany)
D-51368, Leverkusen

Виробник готового продукту

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,
Проєнсдорфер Стр. 324,
D-24106 Кіль, Німеччина

KVP Pharma and Veterinar-Produkt GmbH
(Germany)
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel

