

## Коротка характеристика препарату

### 1. Назва

Флайбайт®.

### 2. Склад

1 г препарату містить діючу речовину (мг) :  
метоміл – 10.

Допоміжні речовини: мускалор (статевий гормон), бітрекс (*denatonium benzoate*), харчові та інертні домішки, цукор.

### 3. Фармацевтична форма

Гранули жовтого кольору.

### 4. Фармакологічні властивості

*ATCvet QP53X\**

Препарат діє як контактна отрута, викликаючи гальмування активності холінестерази, що викликає розлад передавання нервових імпульсів, параліч та загибель комах.

Діюча речовина препарату *метоміл* (група карбаматів) забезпечує втрату резистентності комах. Проявляє інсектицидну дію вже через 5-10 хвилин після розкладання принади. Дія триває протягом 2,5 – 3 місяців.

*Мускалор* (статевий феромон цис-трикозен) забезпечує високу привабливість принади для мух у радіусі до 30 метрів.

*Бітрекс*<sup>™</sup> - гіркий компонент – запобігає з'їданню принади тваринами і птахами.

Харчові та інертні домішки (цукор 98,74%) сприяють тривалому перебуванню мух на принаді (поїдання + контакт).

### 5. Клінічні особливості

#### 5.1 Вид тварин

Боротьба з мухами.

#### 5.2 Показання до застосування

Знищення мух в тваринницьких приміщеннях.

#### 5.3 Протипоказання

Немає.

#### 5.4 Побічна дія

Немає.

#### 5.5 Особливості застереження при використанні

Немає.

#### 5.6. Застосування під час вагітності, лактації, несучості

–

#### 5.7. Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Немає.

#### 5.8. Дозування і способи введення тваринам різного віку

Застосовують двома способами:

1. Гранули розкладають на підкладки (кришки, блюдця) у місцях скупчення мух з розрахунку 2,5 г на 1 м<sup>2</sup>.

2. Гранули розчиняють у воді (100 г принади на 80 мл води), залишають до утворення пасти (близько 15 хв.) і наносять щіточкою на місця/поверхні (вікна, перегородки, опорні балки, підвіконня та ін.), які приваблюють мух. Приготовану пасту наносять з розрахунку 1-2 г на 1 м<sup>2</sup>.

Препарат діє протягом 3 місяців.

#### 5.9. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти).

Немає

#### 5.10. Спеціальні застереження

Уникати попадання препарату на слизові оболонки, шкіру та одяг. Після роботи з препаратом ретельно вимити руки та обличчя.

**5.11.Період виведення (каренція)**

Не визначається.

**5.12.Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу**

Не допускати контакту препарату з незахищеною шкірою рук. Використовувати принаду лише за призначенням. При роботі з препаратом потрібно дотримуватись загальних правил особистої гігієни і техніки безпеки, які передбачені при роботі з ветеринарними препаратами.

**6.Фармацевтичні особливості.**

**6.1. Форми несумісності (основні).**

Невідомі.

**6.2. Термін придатності**

2 роки.

**6.3. Особливі заходи зберігання.**

У сухому захищеному від світла місці за температури від 5 до 25 °С. Зберігати принаду окремо від харчових продуктів і кормів у місцях недоступних для дітей та домашніх тварин.

**6.4. Природа і склад контейнера первинного упакування**

Пластикові відра по 2 кг.

**6.5. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом або його залишками.**

Невикористаний препарат, залишки препарату та тара повинні бути утилізовані у відповідності з національними вимогами.

**7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення.**

Байер Енімал Хелс ГмбХ, D-51368  
Лeverкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH , D-51368  
Leverkusen, Germany

**8. Назва та місцезнаходження виробника (виробників)**

Денка Інтернешнл Б.В.  
3771 НГ Барнвелд, Ханзевег 1  
Нідерланди

Denka International B.V.  
3771NG Barneveld, Hanzeweg 1  
the Netherlands

**9. Додаткова інформація**

**Флайбайт®**  
Листівка-вкладка

**Опис**

Гранули жовтого кольору.

**Склад**

100 г препарату містять діючу речовину :

метоміл – 1 г;

допоміжні речовини:

мускалор (статевий гормон) - 0,25 г,

бітрекс (denatonium benzoate) – 0,01 г;

харчові та інертні домішки (стабілізатори, консерванти, барвники, цукор) до 100 г.

**Фармакологічні властивості**

**АТСvet QR53X\***

Препарат діє як контактна отрута, викликаючи гальмування активності холінестерази, що викликає розлад передавання нервових імпульсів, параліч та загибель комах.

Діюча речовина препарату *Метоміл* (група карбаматів) забезпечує втрату резистентності комах. Проявляє інсектицидну дію вже через 5-10 хвилин після розкладання принади. Дія триває 2,5 – 3 місяці.

*Мускалор* (статевий феромон цис-трикозен) забезпечує високу привабливість принади для мух у радіусі до 30 метрів.

*Бітрекс*<sup>™</sup> - гіркий компонент – запобігає з'їданню принади тваринами і птахами.

Харчові та інертні домішки (цукор 98,74%) сприяють тривалому перебуванню мух на принаді (поїдання + контакт).

**Застосування**

Боротьба з мухами.

**Дозування**

Застосовують двома способами:

1. Гранули розкладають на підкладки (кришки, блюдця) у місцях скупчення мух з розрахунку 2,5 г на 1 м<sup>2</sup>.

2. Гранули розчиняють у воді (100 г принади на 80 мл води) залишають до утворення пасти (близько 15 хв.) і наносять щіточкою на місця/поверхні (вікна, перегородки, опорні балки, підвіконня та ін.), які приваблюють мух. Приготовану пасту наносять з розрахунку 1-2 г на 1 м<sup>2</sup>.

Препарат діє протягом 3 місяців.

**Протипоказання**

Не встановлені.

**Застереження**

Не допускати контакту препарату з незахищеною шкірою рук. Використовувати принаду лише за призначенням. При роботі з препаратом потрібно дотримуватись загальних правил особистої гігієни і техніки безпеки, які передбачені при роботі з ветеринарними препаратами.

**Форма випуску**

Пластикові відра по 2 кг.

**Зберігання**

У сухому, захищеному від світла місці за температури від 5 до 25 °С. Зберігати принаду окремо від харчових продуктів і кормів, у місцях недоступних для дітей та домашніх тварин.

**Термін придатності**

2 роки.

*Тільки для застосування у ветеринарній медицині!*

**Власник реєстраційного посвідчення:**

Байер Енімал Хелс ГмбХ, D-51368  
Лeverкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH, D-51368  
Leverkusen, Germany

**Виробник готового продукту:**  
Денка Інтернешнл Б.В.", Нідерланди  
3771 НГ Барнвелд, Ханзевег 1  
Нідерланди

Denka International  
3771NG Barneveld, Hanzeweg 1  
the Netherlands

# Флай Байт®

# Флай Байт®

## Достатньо для обробки 800 м²

### Флай Байт мш



### 2 КГ



Bayer HealthCare

# ГРАНУЛЫ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ МУХ - ГРАНУЛЫ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ МУХ

**Склад.**  
Метоксип - 1%, мукешлор - 0,25%, бітрес - 0,01%.

**Спосіб застосування.**  
Застосовують двома способами.  
1. Гранули розкладають на підлогу (краще, бачок) у мішок сугучення мух з розрахунку 2,5 г на 1 м².  
2. Гранули розкладають у воді (100 г води з розрахунку 15 хв.), залишають до утворення пасту (бачок 15 хв.), 1 (бака, перетордки, опорні блани, наповніть щоточкою, опорні блани, відкавоня та ін.), які принаповають мух. Підготовлену пасту наносять з розрахунку 1-2 г на 1 м².

**Препарат діє протягом 3 місяців.**

**Застереження.** Не допускайте контакту препарату з незахищеною шкірою рук.

Використовувати препарат лише за призначенням. При роботі з препаратом дотримуватись загальних безпеки, які особливо дієві при роботі з ветеринарними препаратами.

**Умова зберігання.**  
У сухому, захищеному від світла місці при температурі від 5 до 25 °С, окремо від харчових продуктів і кормів, у недоступному для дітей та домашніх тварин місці.

**Термін придатності:** 2 роки.

**Тільки для застосування у ветеринарній медицині!**

**Видісти реєстраційного свідчення:**  
Фарма Байер Зімал Хелс, ГмбХ  
«Делта Інтернешнл Б.В.»  
Нідерланди

**Препарат діє протягом 3 місяців.**

**Застереження.** Не допускайте контакту препарату з незахищеною шкірою рук.

**Склад.**  
Метоксип - 1%, мукешлор - 0,25%, бітрес - 0,01%.

**Спосіб застосування.**  
Применяют двумя способами.  
1. Гранулы раскладывают в воде (100 г воды на расчет 2,5 г на 1 м²).  
2. Гранулы растворяют в воде (100 г воды на расчет 15 минут) и образуют пасту (около 15 минут) и наносят щеточкой на места/поверхности (овна, перетордки, опорные бланы, поддонники и др.), которые привлекают мух. Приготовленную пасту наносят на расчете 1-2 г на 1 м².

**Препарат действует в течение 3 месяцев.**

**Застережения.** Не допускайте контакта препарата с незащищенной кожей рук. Использовать

препарат только по назначению. При работе с препаратом соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, которые предусмотрены при работе с ветеринарными препаратами.

**Условия хранения.**  
В сухом, защищенном от света месте при температуре от 5 до 25 °С, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в недоступном для детей и животных месте.

**Срок годности:** 2 года.

**Только для применения в ветеринарии!**

**Видісти реєстраційного свідчення:**  
Фарма Байер Зімал Хелс, ГмбХ  
«Делта Інтернешнл Б.В.»  
Нідерланди

**Препарат діє протягом 3 місяців.**

**Застереження.** Не допускайте контакту препарату з незахищеною шкірою рук.



1096