

Препарат, содержащий антибиотик Новобиоцин, предназначен для лечения острого и хронического воспаления молочных желёз в период лактации



ГАМАРЕТ

Эмульсия для интрамаммарного введения

СОСТАВ

1 аппликатор 10 мл содержит: бензилпенициллин прокаин моногидрид – 100 мг, неомицинсульфат – 102 000 МЕ, дигидрострептомицин сульфат – 71 250 МЕ, новобиоцин натрия – 100 мг, преднизолон – 10 мг.

ЦЕЛЕВОЙ ВИД ЖИВОТНЫХ

Крупный рогатый скот – дойные коровы в период лактации.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Лечение острого и хронического воспаления молочных желёз в период лактации, вызванного микроорганизмами, чувствительными к новобиоцину, пенициллину, дигидрострептомицину и неомицину.

ДОЗИРОВКА

Содержание одного аппликатора (10 мл препарата) вводится в пораженную часть. Перед введением препарата необходимо подоить воспаленные молочные желёзы, тщательно очистить и продезинфицировать их чистящими салфетками.

Способ введения:

Препарат предназначен только для интрамаммарного введения. Перед использованием тщательно встряхните. При необходимости промойте вымя и соски теплой водой, тщательно высушите. Протрите кончики вымени соответствующим дезинфицирующим средством. Снимите пластиковый колпачок аппликатора и введите аппликатор в сосковый канал. С помощью поршня введите содержимое препарата в вымя. После введения сделайте массаж пораженных участков в целях лучшего распределения препарата в ткани. При необходимости повторите процедуру лечения через 24–48 часов.

ПЕРИОД КАРЕНЦИИ

Мясо – 7 дней, молоко – 72 часа (после 6 доений).

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности нераспечатанной упаковки – 18 месяцев.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре ниже 25 °С в сухом, защищенном от света месте. Не замораживать.

УПАКОВКА

Пластиковый аппликатор 10 мл (в бумажной упаковке 20 аппликаторов).