

Кефен

раствор 10% для инъекций



НЕ ВЫВОДИТСЯ
С МОЛОКОМ



Состав

1 мл препарата содержит:
кетопрофен — 100 мг

Описание

Жидкость бесцветная, прозрачная.

Фармакологические свойства

Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) с выраженным болеутоляющим и жаропонижающим действием.

Кетопрофен — вещество из группы карбоновых кислот, производных пропионовой кислоты. Механизм его действия заключается в ингибировании синтеза простагландинов и тромбксана и базируется на нарушении метаболизма арахидоновой кислоты. В терапевтических дозах кетопрофен ингибирует преимущественно ЦОГ-II и частично ЦОГ-I, обеспечивая противовоспалительное, обезболивающее, жаропонижающее и противоэндотоксическое действие.

После однократного внутримышечного введения максимальная концентрация кетопрофена в плазме крови достигается через 30 минут. Кетопрофен выводится из организма преимущественно почками.

Показания

Лечение **крупного рогатого скота, свиней, лошадей** при остром или хроническом течении воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата (артрит, артроз, бурсит, вывих, отек, тендовагинит, травма, инфекционные поражения копыт), органов дыхания, синдроме метрит-мастит-агалактия, различных формах мастита, болевом синдроме различной этиологии (операция, травма, колики). Применяют как жаропонижающее средство при заболеваниях, сопровождающихся гипертермией и подавленным состоянием.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, геморрагическим синдромом, выраженной почечной или печеночной недостаточностью.

Не применять одновременно с другими НПВП, глюкокортикоидами, антикоагулянтами, диуретиками.



Способ применения и дозы

Препарат вводят внутримышечно (в/м) либо внутривенно (в/в) один раз в сутки в следующих дозах:

- **крупный рогатый скот** (в/м либо в/в) — 0,3 мл на 10 кг массы тела, курс — 1–3 дня;
 - **спортивные лошади** (в/в) — 1 мл на 45 кг массы тела, курс — 3–5 дней (при коликах достаточно одной инъекции, повторная инъекция возможна только после дополнительного обследования животного);
 - **свиньи** (в/м) — 0,3 мл на 10 кг массы тела, курс — 1–3 дня.
- Инъекции более 10 мл делят на две или более частей и вводят в разные места.

Предостережения

Не смешивать с другими препаратами в одном шприце.

После последнего применения препарата забой свиней на мясо разрешается через 4 суток, крупного рогатого скота — через 5 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока, утилизируют или скармливают непродуктивным животным в зависимости от заключения ветеринарного врача. Молоко можно употреблять без ограничений.

Упаковка

Стекланные флаконы темного цвета по 10 мл (по 10 шт. в картонной коробке), по 100 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В упаковке производителя, в сухом, темном месте при температуре от +4 до +25 °С.

Срок годности

2 года.