

ЛАПИМУН ГЕМ

Флаконы
по 10, 100 доз



ЛАПИМУН ГЕМ

против геморрагической болезни кроликов, инактивированная

Состав

Суспензия инактивированного возбудителя геморрагической болезни кроликов, штамм БГ-04 от 640 до 1280 ГАЕ в дозе, что обеспечивает образование вирусспецифических антител в защитном титре $\geq 1:160$ в РЗГА.

Форма выпуска

Суспензия.

Иммунобиологические свойства

Введение вакцины защищает кроликов от геморрагического заболевания в течение 12 месяцев, а защитные антитела формируются через 4-14 суток после вакцинации.

Целевые животные

Кролики.

Показания

Применяют для профилактической иммунизации кроликов против геморрагической болезни (ГБК).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Вакцину можно применять одновременно с вакциной против миксоматоза кроликов LAPIMUN MIX, ЛАПМУН МИКС – вакцина против миксоматоза кроликов, живая, которую вводят с противоположной стороны тела в области лопаток.

Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.

Особые указания (в период сукрольности)

Не рекомендуется вакцинировать крольчих за 7 суток до окрола, так как возможны «механические» аборт из-за стресса животных.

Способ применения и дозы

Вид животного и статус хозяйства	Возраст животного	Дозировка	Способ применения
Кролики в благополучной зоне	Однократно с 10-недельного возраста	1,0 мл	Подкожно за лопаткой
Кролики при угрозе раннего инфицирования	Однократно с 4-х недельного возраста		

Ревакцинацию проводят каждые 12 месяцев.

Период выведения (каренции)

Нулевой.

Срок годности

24 месяца. После первого отбора из флакона – 7 суток.

Условия хранения

Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

Не замораживать!

Вакцины для кроликов