

ЛАПИМУН ГЕМИКС

Флаконы
по 10 и 100 доз



ЛАПИМУН GEMIX

*против геморрагической болезни и миксоматоза кроликов,
комбинированная*

Состав

Вакцина содержит два компонента с равным количеством доз:

- суспензия инактивированного возбудителя геморрагической болезни кроликов, штамм БГ-04 от 640 до 1280 ГАЕ в дозе, в качестве растворителя для лиофилизата;
- лиофилизат вакцинного вируса миксоматоза кроликов, штамм «MAV/RK – 13/20» $\geq 10^{4,0}$ ТЦД₅₀ в дозе.

Форма выпуска

Лиофилизат и суспензия.

Иммунобиологические свойства

Вакцина защищает кроликов от геморрагической болезни и миксоматоза в течение 8-10 месяцев, защитные антитела вырабатываются через 7-14 суток после вакцинации.

Показания к применению

Применяют для профилактической иммунизации кроликов против геморрагической болезни (ГБК) и миксоматоза.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами, с компонентами других вакцин против заболеваний кроликов и компонентами вакцины ЛАПМУН ГЕМИКС других серий. Дегельминтизацию кроликов проводят за 2 недели до вакцинации или через 2 недели после нее.

Особые указания (в период сукрольности)

Не рекомендуется вакцинировать крольчих за 7 суток до окрола, так как возможны «механические» аборт из-за стресса животных.

Способ применения и дозы

Компонент вакцины в форме суспензии после взбалтывания с помощью шприца переносят во флакон с лиофилизированным компонентом.

Статус хозяйства	Возраст животного	Кратность вакцинации	Дозировка	Способ применения
Кролики в благополучной зоне	С 10-недельного возраста	Однократно	1,0 мл	Подкожно за лопаткой
Кролики при угрозе раннего инфицирования	С 4-х недельного возраста	Ревакцинация в возрасте 4 месяца	1,0 мл	

Ревакцинацию проводят каждые 8 месяцев.

Период выведения (каренции)

Нулевой.

Срок годности

18 месяцев. После растворения использовать вакцину в течение 3-х часов.

Условия хранения

Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

www.biotestlab.ua