

ЛАПИМУН МИКС



Флаконы
по 10, 100 доз с растворителем



LAPIMUN MIX

против миксоматоза кроликов, живая

Состав

Одна доза вакцины содержит вирус миксоматоза кроликов штамм MAV/RK – 13/20 $\geq 10^{4,0}$ ТЦД₅₀.

Форма выпуска

Лиофилизат.

Иммунобиологические свойства

Поствакцинальная защита у здоровых кроликов появляется на 4-9-й день после вакцинации и длится 8-10 месяцев.

Целевые животные

Кролики.

Показания

Применяют для профилактической иммунизации кроликов против миксоматоза.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Вакцину можно применять одновременно с вакциной против геморрагической болезни кроликов ЛАПМУН ГЕМ, которую вводят с противоположной стороны тела. Дегельминтизацию кроликов проводят за 2 недели до вакцинации или через 2 недели после нее.

Особые указания (в период сукрольности)

Не рекомендуется вакцинировать крольчих за 7 суток до окрола, так как возможны «механические» аборт из-за стресса животных.

Способ применения и дозы

Вакцину непосредственно перед использованием растворяют стерильным физиологическим раствором или «Растворителем живых вакцин» (стр. 63) 1,0 мл на одну дозу.

Вид животного и статус хозяйства	Возраст животного	Дозировка	Способ применения
Кролики в благополучной зоне	Однократно с 10-недельного возраста	1,0 мл	Подкожно за лопаткой
Кролики в неблагополучной зоне	С 4-х недельного возраста, повторно вакцинируют в 4-х месячном возрасте		
Взрослые кролики	Перед спариванием за 7 дней		

В дальнейшем вакцинацию животных проводят каждые 8 месяцев.

Период выведения (каренции)

Нулевой.

Срок годности

24 месяца. После растворения использовать вакцину в течение 3-х часов.

Условия хранения

Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

