



Вакцина, содержащая  
иммуногенный  
штамм поксвируса  
для трех путей  
введения



## МИКСОРЕН лиофилизат и растворитель для парентерального применения

### Вакцина против миксоматоза живая, МХТ

#### СОСТАВ

Аттенуированный поксвирус миксоматоза мин.  $10^{3,3}$  ЦПД<sub>50</sub>\*, макс.  $10^{3,8}$  ЦПД<sub>50</sub>  
Лиофилизат и растворитель для парентерального применения.  
\*ЦПД – цитопатическая доза.

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Профилактическая вакцинация клинически здоровых кроликов от миксоматоза.

#### ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Вакцина либо вводится путем инъекции в ушную раковину с использованием двойной иглы либо применяется подкожно в области лопатки или с помощью безыгольного инъектора (доза 0,1 либо 0,2 мл).

Упаковка на одну дозу вакцины для подкожного введения содержит 1 мл разбавителя. Для осуществления инъекции вакцины в ушную раковину в упаковке содержится 1,5 мл и 0,8 мл разбавителя, что является достаточным для 100 доз и 50 доз соответственно. Для подкожного введения количество разбавителя составляет 20 мл и 10 мл, что соответствует 20 дозам либо 10 дозам для подкожного

введения. Для введения вакцины дозой 0,2 мл с помощью безыгольного инъектора количество разбавителя составляет 20 мл или 10 мл, что соответствует 80 дозам либо 40 дозам для безыгольного введения. Для введения вакцины дозой 0,1 мл с помощью безыгольного инъектора количество разбавителя составляет 10 мл или 5 мл, причем разбавленная таким образом вакцина соответствует 100 дозам либо 50 дозам.

Антитела материнского происхождения тормозят эффект вакцинации; по этой причине вакцинацию животных не следует проводить в возрасте до 4 недель. При однократной вакцинации в возрасте 10 недель и старше иммунитет сохраняется в течение минимум 6 месяцев. При иммунизации животного в возрасте до 10 недель повторная вакцинация проводится через 6 недель, причем иммунитет сохраняется в течение минимум 6 месяцев. Следующая вакцинация производится не позднее, чем через 6 месяцев после последней вакцинации.

Предпочтительным является осуществление двух вакцинаций в год, а именно, вакцинации весной и повторной вакцинации летом у племенных кроликов в регионах с неблагоприятными инфекционными условиями.

#### СРОК ГОДНОСТИ

2 года; вакцину необходимо использовать в течение 4 часов с момента разведения!

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом темном месте при температуре 2 °С – 8 °С.

#### УПАКОВКА

1 × 10, 5 × 10, 5 × 20 доз для подкожного введения, 1 × 40, 1 × 80, 1 × 50, 1 × 100, 5 × 40, 5 × 80, 5 × 50, 5 × 100 доз для введения с помощью безыгольного инъектора, 1 × 50, 1 × 100, 5 × 50, 5 × 100 доз для введения с помощью двойной иглы.

Упаковки на одну дозу:  
1 × 1, 5 × 1, 10 × 1 доза для подкожного введения.