


Бродлайн Спот-Он

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бродлайн Спот-Он – новейший препарат, разработанный **специально для кошек**
- Эффективная защита **от 22 видов внутренних и внешних паразитов**
- Наружное применение – легко для Вас, **минимум стресса для Вашей кошки**
- Сохранение эффективности даже при мытье с шампунем³
- **Для котят с 7 недель** и взрослых кошек
- **Инновационный аппликатор** – аккуратность применения и точность дозировки



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



1. Разрезать блистер ножницами по линии отреза. Извлечь аппликатор из упаковки.

2. При вертикальном положении аппликатора оттянуть поршень вниз.
3. Наконечник повернуть и снять.

4. Раздвинуть шерсть по средней линии шеи между основанием черепа и лопатками и выдавить все содержимое аппликатора непосредственно на кожу в одно место.

Бродлайн Спот-Он относится к комбинированным противопаразитарным лекарственным препаратам. Входящие в состав препарата фипронил, (S)-метопрен, эприномектин и празиквантел обеспечивают его широкий спектр действия в отношении экто- и эндопаразитов кошек: блох *Ctenocephalides felis* (половозрелые и преимагинальные фазы развития); власоедов *Felicola subrostratus*; иксодовых клещей *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis longicornis*, *Haemaphysalis flava*, *Haemaphysalis campanulata*; саркоптоидных клещей *Otodectes cynotis* (ушной клещ) и *Notoedres cati*; желудочно-кишечных нематод *Toxocara cati* (личинки L3, L4, неполовозрелые и взрослые формы), *Ancylostoma tubaeforme* (личинки L4 и взрослые формы), *Toxascaris leonina* и *Ancylostoma braziliense* (половозрелые формы); нематод мочевого пузыря *Capillaria plica*; легочных нематод *Aelurostrongylus abstrusus* (личинки L4 и взрослые формы), *Capillaria aerophila*; личинок диروفиларий *Dirofilaria immitis*; цестод *Dipylidium caninum*, *Taenia taeniiformis*, *Echinococcus multilocularis* (все фазы развития).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

¹Bussi ras et al, 1997; Beugnet et al, 2000; Mircean et al, 2010; Barutzki and Schaper, 2011; Capar  et al, 2013

²Beck et al, 2006; Bonds et al, 2007; Farkas et al, 2008; Beugnet et al, 2010

³дважды в месяц

Бродлайн Спот-Он

Эффективная защита от 22 внутренних и внешних паразитов



ВНЕШНИЕ
ПАРАЗИТЫ

ВНУТРЕННИЕ
ПАРАЗИТЫ

Для тех, кто любит кошек

ВНУТРЕННИЕ ПАРАЗИТЫ

До 30 % кошек поражены **гельминтами**¹



Более **10 видов** гельминтов паразитируют в организме кошки

4 ИЗ НИХ ЯВЛЯЮТСЯ **ОБЩИМИ** **ДЛЯ КОШКИ И ЧЕЛОВЕКА**



Риск заражения гельминтами возрастает, если:

- **отсутствует** регулярная профилактика гельминтозов
- кошка **питается сырой рыбой и мясом**
- кошке **позволяется контакт с пищей человека**
- у владельца нет привычки **мыть руки** после общения с кошкой
- **хозяин не использует перчатки** при чистке кошачьего лотка

СИМПТОМЫ

Внутренние паразиты

- Истощение
- Тусклая шерсть
- Расстройство пищеварения
- Рвота

Внешние паразиты

- Тусклая шерсть
- Расчесы
- Беспокойство
- Анемия

Симптомы могут не проявляться длительное время



Особенно важно, если:

- Кошка активно гуляет и охотится на улице
- Возраст кошки до 6 месяцев
- Кошка живет в семье, где есть маленькие дети
- В доме содержится более одного животного

Применять Бродлайн Спот-Он **ЕЖЕМЕСЯЧНО**



ВНЕШНИЕ ПАРАЗИТЫ

До 70 % кошек заражены **блохами**²



Блохи – одна из основных причин аллергического дерматита

Блохи являются **переносчиками** инфекционных заболеваний:

- риккетсиоза
- микоплазмоза
- фелиноза или «болезни кошачьих царапин» (**острого инфекционного заболевания человека**, вызываемого бактерией Bartonellой)



Иксодовые клещи доставляют беспокойство кошкам укусами и являются **переносчиками болезни Лайма (боррелиоза)** – также **общей для человека и кошки**



Домашние кошки **ПОДВЕРЖЕНЫ РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ** гельминтами и блохами. Яйца блох и гельминтов можно занести в дом на обуви или одежде.

СИМПТОМЫ ЗАРАЖЕНИЯ КОШКИ ПАРАЗИТАМИ МОГУТ БЫТЬ НЕЗАМЕТНЫ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

ЭТО ВАЖНО!