



Защита от RHD
и миксоматоза
в одной инъекции



ПЕСТОРИН МОРМИКС

**Лиофилизат и растворитель для суспензии для инъекций
Вакцина против геморрагической болезни
кроликов и миксоматоза**

СОСТАВ

Действующие вещества в одной дозе:

Жидкий компонент:

Калицивирус геморрагической болезни кроликов (*Calicivirus septicaemiae haemorrhagiae cuniculi (solution organorum)*) – мин. 80*, алюминия гидроксид, тиомерсал, буферный солевой раствор.

*Титр антител индукции геммаглютинации после вакцинации лабораторных животных (кролик)

Лиофилизированный компонент:

Аттенуированный поксвирус миксоматоза (*Poxvirus myxomatosa*) – мин. $10^{5.8}$ ЦПД₅₀*, среда для культивации – минимальная необходимая среда, среда для культивации. Раствор для инъекций. Для кроликов.

*ЦПД – цитопатическая доза.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для профилактической иммунизации клинически здоровых кроликов против геморрагической болезни кроликов и миксоматоза. Вакцинация кроликов производится в возрасте 10 недель.

Вакцинация может проводиться ранее в неблагоприятных инфекционных условиях, а именно:

а) Вакцинация с использованием моновалентной вакцины против миксоматоза (Миксорен) может производиться в возрасте 4 недели и старше с последующей повторной вакцинацией с использованием вакцины Песторин Мормикс, которая может вводиться не ранее, чем в возрасте 10 недель. Между введением вакцин Миксорен и Песторин Мормикс необходимо выдерживать интервалы как минимум в 2 недели.

б) Вакцинация с использованием вакцины Песторин Мормикс может производиться в возрасте 6 недель и старше с последующей повторной вакцинацией через 4 недели. Производить следующие повторные вакцинации с использованием вакцины Песторин Мормикс рекомендуется с интервалом в 6 месяцев для племенных животных. С учетом сезонной

частоты развития заболевания, необходимо вовремя проводить (повторную) вакцинацию животных с целью обеспечения наличия полного иммунитета на протяжении всего критического периода заболеваемости инфекцией.

КОЛИЧЕСТВО И ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ

Доза: 1 мл независимо от веса животного.

Путь введения: подкожно.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца. Использовать вакцину в течение 2-х часов после смешивания компонентов!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом темном месте при температуре 2 °С – 8 °С. Не допускать замораживания вакцины!

УПАКОВКА

1 × 1, 5 × 1, 10 × 1 доза,
1 × 5, 5 × 5, 10 × 5, 1 × 10 доз,
5 × 10, 10 × 10 доз.