

GMP
CERTIFIED



[← Назад в каталог](#)

ПимоПЕТ

1. Общие сведения

1.1 ПимоПЕТ (PimoPET)

1.2 По внешнему виду препарат представляет собой таблетки плоско-цилиндрической формы со скошенными краями красноватого цвета с легким специфическим запахом, с крестообразной бороздкой или без нее.

1.3 Одна таблетка массой 320 мг содержит: 5,0 мг пимобендана и вспомогательные вещества.

- 1.4 Препарат выпускают расфасованным по 30 и 100 таблеток в пластиковые банки соответствующей вместимости с контролем вскрытия.
- 1.5 Срок годности таблеток в закрытой потребительской таре 36 месяцев от даты изготовления. Хранят при температуре от 0°C до + 25°C и относительной влажности не более 75%.

2. Фармакологические свойства

- 2.1 Фармакологические свойства препарата обусловлены действующим АФВ входящими в его состав. ПимоПЕТ применяется в ветеринарии для лечения у собак сердечно-сосудистой недостаточности вызванной недостаточностью клапанов, это может быть регургитация митрального либо трикуспидального клапанов, а также дилатационной кардиомиопатией, которые сопровождаются такими характерными симптомами как кашель, снижение устойчивости к нагрузкам, одышка или асцит.

Препарат частично ингибирует фосфодиэстеразу III и одновременно повышает чувствительность миофибрилл сердца к ионам кальция. Препарат не только усиливает сократительную функцию миокарда, но и одновременно обеспечивает артериальную вазодилатацию.

3. Порядок применения препарата

- 3.1 ПимоПЕТ (PimoPET) дозировка составляет 0,5 мг действующего вещества на 1 кг массы тела, суточную дозу распределяют на 2 приема. Это соответствует 1 таблетке ПимоПЕТ 5мг утром и 1 таблетке ПимоПЕТ 5мг вечером на 20 кг живой массы. Широта терапевтической дозировки колеблется от 0,2 мг до 0,6 мг на 1 кг массы тела, разделенные на 2 приема в сутки, ежедневно. ПимоПЕТ необходимо давать через рот. Дача препарата ПимоПЕТ должна происходить примерно за один час до кормления. ПимоПЕТ может назначаться также в комбинации с мочегонным средством, например, фуросемидом. В случае декомпенсированной сердечной недостаточности рекомендована пожизненная продолжительная терапия препаратом ПимоПЕТ. Поддерживающая доза должна быть подобрана индивидуально в зависимости от тяжести заболевания.

4. Побочные действия

- 4.1 В редких случаях встречается легкое положительно хронотропное действие (повышение ЧСС), а также рвота. Эти эффекты зависят от дозы и могут быть предотвращены сокращением дозы.

5. Противопоказания

5.1 Гиперчувствительность к пимобендану.

5.2 Не принимать при гипертрофической кардиомиопатии и заболеваниях, при которых увеличение сердечного выброса не может быть достигнуто по функциональным или анатомическим причинам (например, при стенозе устья аорты).

5.3 Поскольку ПимоПЕТ выделяется из организма преимущественно через печень, этот препарат не должен применяться у собак с тяжелыми формами печеночной недостаточности.

[in English](#)

[Latviešu](#)

[Формула сайтов](#)