

## **ПРОВЕРАВЕТ** (таблетки)

### **Описание**

Таблетки от белого до сероватого цвета со специфическим запахом.

### **Состав**

Одна таблетка (0,12 г) препарата содержит действующее вещество:  
медроксипрогестерона ацетат - 5 мг.

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактоза, тальк, кальция стеарат.

### **Фармакологические свойства**

*ATCvet QG, ветеринарные препараты, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны (QG03A гормональные контрацептивы для системного применения)*

Действующим веществом препарата является медроксипрогестерона ацетат - синтетический прогестин, аналог прогестинов, продуцируемых желтым телом. Действие заключается в превращении пролиферативного эндометрия в секреторный, усиливает гипертрофию миометрия и подавляет сокращение матки. В зависимости от дозы подавляет секрецию гипофизарных гонадотропинов, обладает антиинсулиновым действием. У животных медроксипрогестерона ацетат оказывает выраженный аденокортикальный эффект и подавляет выделение аденокортикотропного гормона и кортизола.

Медроксипрогестерон обладает антиэстрогенным действием и снижает уровень тестостерона в плазме крови самцов.

### **Применение**

Препарат ПРОВЕРАВЕТ применяют самкам и самцам собак и кошек:

- сучкам и кошкам для задержки и прерывания течки;
- котам и кобелям - для снижения половой активности и коррекции нежелательного поведения (мечения территории мочой, внутривидовой агрессии, повышенной возбудимости).

Препарат также предотвращает возникновение признаков псевдо беременности и лактации.

### **Дозировка**

Препарат ПРОВЕРАВЕТ применяют перорально, принудительно на корень языка или с небольшим количеством корма за 1-2 часа до основного кормления животного в дозах:

#### ***Кошки:***

- для предупреждения течки - 1 таблетка 1 раз в неделю, применять препарат в течение периода, когда желательнее отсрочить течку. После отмены препарата охота наступает примерно через 2 недели. Препарат нельзя применять дольше 18 месяцев.

- для прекращения течки - 1 таблетка 1 раз в сутки в течение 3-5 суток до прекращения признаков течки, не позднее чем на третий день после начала течки, а затем 1 таблетка 1 раз в неделю. Прерывать течку нельзя чаще чем 2 раза в год.

#### ***Коты:***

-- при появлении признаков полового возбуждения, для успокоения и коррекции нежелательного поведения (мечения территории мочой, внутривидовой агрессии, повышенной возбудимости) - 1 таблетка 1 раз в сутки в течение 8 суток и далее по 1 таблетке - 1 раз в неделю.

#### ***Суки:***

- для предупреждения течки - 1 таблетка на 10 кг массы тела животного 1 раз в сутки за 7-15 суток до прекращения течки, после прекращения применения препарата охота наступает через несколько дней; препарат нельзя применять дольше чем 32 суток непрерывно;

- для прекращения течки - 1 таблетка на 10 кг массы тела животного 1 раз в сутки в течение первых 3 суток, а затем 2 таблетки на 10 кг массы тела животного 1 раз в сутки в течение 7 дней до прекращения признаков течки, не позднее чем на третий день после начала течки. После отмены препарата течка обычно начинается через 4-9 месяцев. Не рекомендуется применять препарат чаще, чем 2 курса в год.

#### ***Кобели:***

- при появлении признаков полового возбуждения, для успокоения и коррекции нежелательного поведения (мечения территории мочой, внутривидовой агрессии, повышенной возбудимости) - 4 таблетки на 10 кг массы тела животного в сутки в течение 8 суток, а затем 2 таблетки на 10 кг массы тела животного на сутки в течение 8 суток.

#### **Противопоказания**

Препарат не применяют животным в период беременности и лактации и при псевдо беременности и лактации!

Препарат не применяют при заболеваниях мочеполовой и эндокринной систем, нарушении регулярности полового цикла, опухолях молочной железы, у неполовозрелых животных (до первой течки)!

Препарат не применяют, если после возникновения течки прошло более 2 суток!

#### **Предостережения**

при длительном применении возможны изменения полового цикла, увеличение молочных желез, чрезмерный аппетит и увеличение массы тела.

Препарат применять под наблюдением ветеринарного врача, особенно для собак породы борзая.

#### **Форма выпуска**

Блистеры по 10 таблеток. Вторичная упаковка - картонные коробки по 10, 20, 50 и 100 таблеток.

#### **Хранение**

Сухое темное, недоступное для детей, место при температуре от 10 до 25 ° С.

#### **Срок годности**

3 года.