

ШУСТРИК СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Применение:

Лекарственный препарат для дегельминтизации грызунов и зайцеобразных

Форма выпуска:

Полимерный флакон 5 мл со шприцем-дозатором. Внешняя упаковка – картонная коробка.

Преимущества

- Широкий спектр антигельминтного действия.
- Высокая эффективность.
- Безопасность применения.
- Шприц-дозатор в комплекте.

Состав и фармакологические свойства.

«Шустрик» суспензия в 1 мл в качестве действующих веществ содержит фенбендазол – 2,5 мг и празиквантел – 1,5 мг и вспомогательные вещества.

Суспензия «Шустрик» обладает нематодоцидным и цестодоцидным действием в отношении гельминтов, паразитирующих у грызунов, в том числе *Syphacia obvelata*, *Aspiculuris tetraptera*, *Nippostrongylus muris*, *Nippostrongylus braziliensis*, *Heterakis spumosa*, *Trichocephalus muris*, *Trichocephalus sylvilagi*, *Trichostrongylus retortaeformis*, *Paraspidodera uncinata*, *Strongyloides spp.*, *Passalurus ambiguus*, *Hymenolepis diminuta*, *Hymenolepis pana*. Механизм действия входящего в состав препарата фенбендазола заключается в разрушении микроканальцев в клетках кишечника гельминтов и нарушении энергетических процессов, что приводит к гибели паразитов.

Механизм действия празиквантела основан на деполаризации нейромышечных ганглиоблокаторов, нарушении у цестод транспорта глюкозы и микротубулярной функции, нарушении мышечной иннервации, паралич и гибель гельминта.

Показания к применению.

Шустрик суспензию применяют грызунам, декоративным и лабораторным кроликам.

Противопоказания.

Повышенная индивидуальная чувствительность к активным компонентам препарата.

Дозы и порядок применения.

Перед применением суспензию следует тщательно взболтать.

Препарат применяют однократно перорально индивидуально или групповым способом в дозе 1 мл/кг массы животного, что составляет (для одного животного массой):

- кролика 3 кг – 3,0 мл;
- мыши 18–20 г – 0,02 мл;
- крысы 180–200 г – 0,2 мл;
- морской свинки 150–200 г – 0,2 мл.

С лечебной целью дегельминтизацию животных проводят по показаниям, с профилактической – ежеквартально в терапевтической дозе.

При групповом способе применения препарата с питьевой водой рассчитанную на группу животных дозу суспензии «Шустрик» разбавляют водой в соотношении 1:10 и выпаивают в течение 1 суток в поилках вместимостью 50–100 мл с учетом нормы потребления животным питьевой воды (0,1 мл на 10 г массы животного).

При применении препарата с кормом рассчитанную на группу животных дозу суспензии «Шустрик» вводят в корм из расчета 1 мл на 50 г, тщательно перемешивают (сухой корм подсушивают) и скармливают животным в течение 1 суток.

Во время дегельминтизации животные должны получать только воду (корм) с препаратом.

Побочные явления.

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и осложнений не наблюдается.

Хранение.

Хранить препарат в защищенном от света и влаги, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

Форма выпуска.

Полимерный флакон 5 мл со шприцем-дозатором. Внешняя упаковка – картонная коробка.