

СУЛЬФ ГРАНУЛЫ И СУЛЬФ 480 ТАБЛЕТКИ



Применение:

Гранулы и таблетки для лечения бактериальных инфекций у продуктивных животных

Форма выпуска:

«Сульф гранулы» – полимерная банка емкостью 1 кг, пакет из многослойной бумаги 0,5 кг; «Сульф 480» – полимерная банка (70 таблеток).

Преимущества

- Обеспечивает профилактику диареи у молодняка продуктивных животных.
- Высокая бактерицидная активность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.
- Синергидное действие компонентов.

Состав и фармакологические свойства.

1 г «Сульф гранулы» содержит 0,02 г триметоприма и 0,1 г сульфадиазиона; 1 таблетка «Сульф 480» содержит 0,08 г триметоприма и 0,4 г сульфадиазиона. Действующие вещества, входящие в состав препарата, обладают синергидным действием, оказывают бактерицидное воздействие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания. Препарат быстро всасывается в кровь и проникает во все органы и ткани животного. Максимальная концентрация действующих веществ «Сульф» в крови отмечается через 3–4 часа после применения и удерживается не менее 12 часов.

Показания к применению.

«Сульф» применяют молодняку крупного и мелкого рогатого скота, жеребят, свиньям и пушным зверям для лечения бактериальных инфекций органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, кожи, раневых инфекций, пастереллеза, сальмонеллеза и других заболеваний, возбудители которых чувствительны к препарату.

Противопоказания.

Повышенная индивидуальная чувствительность к активным компонентам препарата, нарушения функций органов кроветворения, печени и почек, беременным и лактирующим животным.

Дозы и порядок применения.

Препарат дают животным в смеси с кормом, или предварительно растворив в воде или молоке. Суточная доза: «Сульф гранулы» – 1 г на 4 кг массы животного, «Сульф 480» – 1 таблетка на 16 кг массы животного. Суточную дозу препарата дают в два приема с интервалом в 12 часов. Курс лечения 5–7 дней.

Побочные явления.

При повышенной чувствительности к действующим веществам препарата возможны аллергические реакции.

Период ожидания.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 9 дней после последнего применения препарата. Мясо вынужденно убитых животных может быть использовано для изготовления мясокостной муки.

Хранение.

Хранить препарат в заводской упаковке, в защищенном от света и влаги, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 до 25°C.