

ВЕТБИЦИЛИН-5 (раствор для ветеринарии)

Описание
Прозрачный раствор
с желтоватым оттенком.

Состав
1 флакон препарата содержит
действующие вещества :
бензатина бензилпенициллин стерильный - 1200000 ЕД
бензилпенициллина новокаиновая соль стерильная - 300 000 ЕД .

Фармакологические свойства:

Ветбициллин-5 активен в отношении грамположительных микроорганизмов, включая *Staphylococcus* spp., *Streptococcus pneumoniae*, *Corynebacterium diphtheriae*, анаэробных спорообразующих палочек, *Bacillus anthracis* и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Neisseria meningitidis*, *Actinomyces israelii*, а также в отношении *Treponema* spp. После внутримышечного введения ветбициллин-5 всасывается в кровь и сохраняется в терапевтической концентрации на протяжении 10-15 суток. Выводится из организма главным образом с мочой и частично с фекалиями.

Применение

Ветбициллин-5 назначают крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, пушным зверям, кроликам, индейкам, гусям и уткам для лечения инфекционных заболеваний, вызываемых чувствительными к бензилпенициллину микроорганизмами. Ветбициллин-5 необходимо вводить в случаях, когда надо создать длительную концентрацию пенициллина в крови.

Крупному рогатому скоту	15 000 ЕД на 1 кг массы животного	1 мл на 20 кг веса
Лошадям	20 000 ЕД на 1 кг массы животного	1,5 мл на 20 кг
Мелкому рогатому скоту	20 000 ЕД на 1 кг массы животного	1,5 мл на 20 кг
Свиньям	20 000 ЕД на 1 кг массы животного	1,5 мл на 20 кг

При необходимости раствор ветбициллин-5 применяют повторно через 10-15 суток.

Побочные действия

У гиперчувствительных животных возможны аллергические реакции. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к антибиотикам пенициллинового ряда и появлении аллергических реакций использование препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Предостережение

Убой животных на мясо разрешается через 15 суток после последнего применения ветбицилина-5. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям. Молоко от дойных животных, полученное в период лечения и в течение семь суток после последнего введения ветбициллина-5, запрещается использовать в пищевых целях. Такое молоко может быть использовано после термической обработки для кормления животных.

Форма выпуска

Стеклянные флаконы по 10, 20, 50, 100 мл.

Хранение

В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей при температуре от 10 °С до 25 °С.

Срок годности - 3 года.