

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора  
*С.А. ЧЕПОКЛОНОВ*

*20 Ноя 2015*

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Раносан<sup>®</sup> порошка для лечения ран, заболеваний кожи и мягких тканей бактериальной этиологии, профилактики послеоперационных инфекций у собак, кошек, пушных зверей, декоративных грызунов и спортивных лошадей

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 117437, г. Москва,  
ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Раносан<sup>®</sup> порошок (Ranosan pulver).

Международное непатентованное наименование: хлорамфеникол, метилурацил, лидокаин.

2. Лекарственная форма: порошок для наружного применения.

Раносан<sup>®</sup> порошок в 1 г в качестве действующих веществ содержит: хлорамфеникол – 10 мг, метилурацил – 30 мг и лидокаина гидрохлорид – 50 мг, а в качестве вспомогательных веществ: крахмал картофельный, окись цинка и карбоксиметилцеллюлозу.

3. По внешнему виду препарат представляет собой порошок белого с желтым оттенком или серого цвета.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.

Запрещается применять Раносан<sup>®</sup> порошок по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат расфасованным в банках из полиэтилена по 5 и 10 г, укупоренных пластмассовыми крышками. Банки упаковывают поштучно в картонные пачки в комплекте с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °C до 25 °C.

6. Раносан<sup>®</sup> порошок следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства

9. Раносан<sup>®</sup> порошок относится к антисептическим, ранозаживляющим лекарственным препаратам.

10. Хлорамфеникол, входящий в состав препарата – антибиотик из группы амфениколов, оказывает бактерицидное и бактериостатическое действие на большинство грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих инфекции кожи и мягких тканей.

Метилурацил – производное пиримидина, регулирует метаболические процессы, ускоряет процессы регенерации, способствует заживлению ран, повышает уровень местного иммунитета, обладает противовоспалительными свойствами.

Лидокаин обладает местно-анестезиющим действием, механизм которого основан на снижении или полном подавлении возбудимости чувствительных нервных окончаний и торможении проведения нервного импульса по нервным волокнам.

Раносан<sup>®</sup> порошок по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает резорбтивно-токсического и кожно-раздражающего действия.

### III. Порядок применения

11. Раносан<sup>®</sup> порошок применяют собакам, кошкам, пушным зверям, декоративным грызунам и спортивным лошадям для лечения хирургических ран и травматических повреждений, ожогов, пролежней, обморожений, воспалительных заболеваний кожи и мягких тканей, а также для профилактики послеоперационных инфекций (после кастраций, купирования хвостов и ушей, наложения швов).

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная непереносимость компонентов препарата (в том числе в анамнезе). Не следует допускать слизывания лекарственного препарата животными и попадания его в глаза.

13. Перед применением препарата на пораженной поверхности выстригают шерсть, освобождают рану от механических загрязнений, корок, струпьев, промывают антисептическими растворами.

Раносан<sup>®</sup> порошок наносят тонким слоем на пораженную поверхность с помощью шпателя, стеклянной палочки, ватно-марлевого тампона, равномерно распределяя от периферии к центру пораженного участка с захватом пограничной здоровой кожи до 1 см один раз в сутки ежедневно до полного заживления пораженной поверхности, но не более 14 дней.

14. Симптомы передозировки препарата у животных не выявлены.

15. Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

16. Применение препарата беременным и кормящим самкам возможно после консультации с ветеринарным врачом.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.

18. При применении Раносан<sup>®</sup> порошка в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений не обнаружено.

При повышенной индивидуальной чувствительности животных к компонентам препарата и появлении аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости проводят десенсибилизирующую терапию.

19. Раносан<sup>®</sup> порошок не следует применять одновременно с другими аналогичного назначения, лекарственными препаратами для наружного применения.

20. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Раносан<sup>®</sup> порошком следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Раносан<sup>®</sup> порошком. Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Раносан порошка, утвержденная Россельхознадзором 20 июня 2014 года.

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-5.14-2875 № ПВР-3-4.3/01328