

28.12.2015

Стронгхолд 6%
(роздріб для зовнішнього застосування)
листівка–вкладка

Опис

Розчин для зовнішнього застосування у пластикових тубах.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

селамектин - 60 мг.

Допоміжні речовини: діпропілен гліколь метил ефір, ізопропіловий спирт, бутилгідрокситолуен.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP54, ендектоциди (QP54AA05, селамектин)

Діюча речовина препарату селамектин – напівсинтетичний івермектин. Механізм дії пов'язаний зі зміною активності хлорних каналів синаптичних мемброн у нервовій та м'язовій системах багатьох ектопаразитів. Зв'язуючись зі специфічними рецепторами, він збільшує проникність синаптичних мемброн для іонів хлору, що призводить до блокади електричної активності нервових та м'язових клітин паразитів, та, як наслідок, їх паралічу та загибелі. У ссавців подібні рецептори розміщені лише у центральній нервовій системі. Оскільки селамектин не володіє здатністю проникати крізь гематоенцефалічний бар'єр, він має високий рівень безпечної, і у рекомендованих дозах є безпечним для собак та котів.

Селамектин проявляє широкий спектр системної нематодоцидної, інсектицидної та акарицидної дії, має ларвоцидні та овоцидні властивості.

Препарат швидко і повністю всмоктується з місця нанесення у кров. Терапевтичні концентрації селамектину у крові підтримуються тривалий час, забезпечуючи знищенння паразитів та захист від реінвазії протягом місяця.

Застосування

Собаки: профілактика та лікування отодектозу (*Otodectes Cynotis*), саркоптозу (*Sarcoptes scabies*), токсокарозу (*Toxocara canis*), інвазії вошів (*Trichodectes canis*) та бліх (*Ctenocephalides spp.*), а також для профілактики дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis* та *Dirofilaria repens*).

Коти: профілактика та лікування отодектозу (*Otodectes Cynotis*), анкілостомозу (*Ancylostoma tubaeforme*), токсокарозу (*Toxocara cati*), інвазії вошів (*Felicola subrostratus*) та бліх (*Ctenocephalides spp.*), а також для профілактики дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis* та *Dirofilaria repens*).

Дозування

Препарат наносять на суху шкіру між лопатками у наступних дозах:

Коти маса тіла, кг	Колір ковпачка	Доза д.р. на тварину, мг	Концентрація	Номінальний об'єм туби, мл
≤ 2,5	Рожевий	15	6%	0,25
2,6 – 7,5	Блакитний	45	6%	0,75
> 7,5	Комбінація туб з розрахунку 6 мг д.р. на кг маси тіла			

Собаки маса тіла, кг	Колір ковпачка	Доза д.р. на тварину, мг	Концентрація	Номінальний об'єм туби, мл
≤ 2,5	Рожевий	15	6%	0,25
> 2,5	Використання препарату в концентрації 12%			

28.12.2015

Знищення бліх (собаки та коти)

Після нанесення препарату дорослі блохи гинуть. Для запобігання інвазії препарат застосовують один раз на місяць впродовж сезону активності бліх. Лікування вагітних та лактуючих тварин запобігає блошиній інвазії у кошенят та цуценят до 7-тижневого віку.

Для використання як складової частини терапії при блошиному алергічному дерматиті препарат застосовують з місячним інтервалом.

Профілактика дирофіляріозу (собаки та коти)

Для профілактики дирофіляріозу Стронгхолд застосовують тваринам кожного місяця, починаючи за місяць до початку льоту переносників збудника – москітів/комарів та закінчується не раніше ніж через місяць після завершення льоту комах. У випадку, коли місячний інтервал між двома використаннями Стронгхолду був порушений, препарат наносять одразу, як тільки з'являється така можливість, що мінімізує можливість розвитку статевозрілих дирофілярій. У випадку використання іншого препарату для профілактики дирофіляріозу, наступне використання препарату Стронгхолд проводять через місяць після останнього використання попереднього препарату.

Дегельмінтизація при токсокарозі (собаки та коти)

Тварини віком від 6 тижнів та старше: препарат застосовують однократно.

Лікування від воші (собаки та коти)

Препарат застосовують однократно.

Лікування отодектозу (собаки та коти)

Препарат застосовують однократно. Перед лікуванням рекомендують прочистити слуховий прохід від ексудату та струпів. У разі необхідності курс лікування повторюють через місяць.

Лікування анкілостомозу (коти)

Препарат застосовують однократно.

Лікування саркоптозу (собаки)

Препарат застосовують двічі з інтервалом один місяць.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам віком до 6 тижнів, а також виснаженим і хворим тваринам.

Застереження

Препарат застосовують лише для зовнішнього застосування.

Не наносити препарат на вологу шкіру.

Не можна купати тварин впродовж 2 годин після нанесення препарату (до повного висихання).

Не палити, пити або приймати їжу під час роботи з препаратом.

Препарат зберігати подалі від джерел тепла та вогню.

Після обробки тварин ретельно вимити руки з милом. При випадковому попаданні препарату в очі промити їх проточною водою та звернутися до лікаря.

Після обробки тварини препаратором не контактувати з нею до повного висихання шкіри на місці нанесення (приблизно 30 хвилин).

Препарат токсичний для риб та водних організмів.

Форма випуску

Препарат випускається в одно-дозованих пластикових тубах в алюмінієвих блістер-пакетах. Туби відрізняються за кольором ковпачка:

туби з рожевим ковпачком - 0,25 мл 6% розчину,

туби з блакитним ковпачком - 0,75 мл 6% розчину.

Зберігання

Сухе місце за температури від 10 до 30 °C.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення АА-03667-01-13

28.12.2015

Власник реєстраційного посвідчення
Зоетіс Інк. (Сполучені Штати Америки)
100 Кампус Драйв, Флорхем Парк,
Нью-Джерсі 07932

Виробник готового продукту
Зоетіс Інк., (Сполучені Штати Америки)
I Кілгор Роуд, Каламазу, MI 49001

Zoetis Inc. (USA)
100 Campus Drive, Florham Park,
New Jersey 07932

Zoetis Inc., (USA)
I Kilgore Road, Kalamazoo, MI 49001